平成19年度 京都大学 2次試験前期日程(数学問題)150分
理, 医, 薬, 工, 農, 総合人間(理系), 経済(理系)

- 理・医[医学科]・薬, 工, 農, 総合人間(理系), 経済(理系) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
数I・II・III・A・B・C(150分)
- 医[人間健康科学科]・教育(理系) ② ③ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
数I・II・III・A・B・C(150分)

① (1) 定積分 $\int_0^2 \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}} dx$ を求めよ.

(2) 1歩で1段または2段のいずれかで階段を昇るとき, 1歩で2段昇ることは連続しないものとする. 15段の階段を昇る昇り方は何通りあるか.

② x, y を相異なる正の実数とする. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 0, \quad a_{n+1} = xa_n + y^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定めるとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ が有限の値に収束するような座標平面的点 (x, y) の範囲を図示せよ.

③ p を3以上の素数とする. 4個の整数 a, b, c, d が次の3条件

$$a + b + c + d = 0, \quad ad - bc + p = 0, \quad a \geq b \geq c \geq d$$

を満たすとき, a, b, c, d を p を用いて表せ.

④ 点 O を中心とする円に内接する $\triangle ABC$ の3辺 AB, BC, CA をそれぞれ2:3に内分する点を P, Q, R とする. $\triangle PQR$ の外心が点 O と一致するとき, $\triangle ABC$ はどのような三角形か.

⑤ A を2次の正方行列とする. 列ベクトル $\vec{x}_0$ に対し, 列ベクトル $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots$ を

$$\vec{x}_{n+1} = A\vec{x}_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

によって定める. ある零ベクトルではない $\vec{x}_0$ について, 3以上の自然数 m で初めて $\vec{x}_m$ が $\vec{x}_0$ と一致するとき, 行列 A^m は単位行列であることを示せ.

- 6** すべての実数で定義され何回でも微分できる関数 $f(x)$ が $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ を満たし, さらに任意の実数 a, b に対して $1 + f(a)f(b) \neq 0$ であって

$$f(a+b) = \frac{f(a) + f(b)}{1 + f(a)f(b)}$$

を満たしている.

- (1) 任意の実数 a に対して, $-1 < f(a) < 1$ であることを証明せよ.
- (2) $y = f(x)$ のグラフは $x > 0$ で上に凸であることを証明せよ.

- 7** 次の各問にそれぞれ答えよ.

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ とするとき,

$A^6 + 2A^4 + 2A^3 + 2A^2 + 2A + 3E$ を求めよ.

- (2) 得点 $1, 2, \dots, n$ が等しい確率で得られるゲームを独立に 3 回くり返す. このとき, 2 回目の得点が 1 回目の得点以上であり, さらに 3 回目の得点が 2 回目の得点以上となる確率を求めよ.

- 8** $\triangle ABC$ において, $\angle A$ の二等分線とこの三角形の外接円の交点で A と異なる点を A' とする. 同様に $\angle B$, $\angle C$ の二等分線とこの外接円との交点をそれぞれ B' , C' とする. このとき 3 直線 AA' , BB' , CC' は 1 点 H で交わり, この点 H は三角形 $A'B'C'$ の垂心と一致することを証明せよ.

- 9** $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ とする. 座標平面上で原点の回りに $\frac{\pi}{3}$ 回転する 1 次変換を f とし, 直線 $y = (\tan \alpha)x$ について対称移動する 1 次変換を g とする. 合成変換 $f \circ g$ が x 軸について対称移動する 1 次変換と一致するとき, α の値を求めよ.

- 10** $y = xe^{1-x}$ と $y = x$ のグラフで囲まれた部分を x 軸の周りに回転してできる立体の体積を求めよ.

解答例

$$\boxed{1} \quad (1) \int_0^2 \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4}} dx = \left[2\sqrt{x^2+4} + \log(x + \sqrt{x^2+4}) \right]_0^2 \\ = 4(\sqrt{2}-1) + \log(1 + \sqrt{2})$$

補足 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+A}} dx = \log(x + \sqrt{x^2+A}) + C$ (A は定数, C は積分定数)

(2) n 段の階段を昇る昇り方の総数を a_n とする.

- 最初に 1 段昇ったとき, 残りの $n-1$ 段を昇る a_{n-1} 通り.
- 最初に 2 段, 1 段と昇ったとき, 残りの $n-3$ 段を昇る a_{n-3} 通り.

したがって, 次の漸化式が成立する.

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_n = a_{n-1} + a_{n-3} \quad (n \geq 4)$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a_n	1	2	3	4	6	9	13	19	28	41	60	88	129	189	277

よって, 求める場合の数は **277** (通り)

別解 1 段昇ることを A, 2 段昇ることを B とし, A, B の組合せは, B が隣り合わないことに注意すると次のようになる.

A	15	13	11	9	7	5
B	0	1	2	3	4	5

一列に並んだ A の両側およびその間に B を配置する場合の数であるから (例: A = 9, B = 3 のとき, 先ず A を 9 個並べ, A の間とその両側の 10 か所から 3 か所を選んで B を並べる ${}_{10}C_3$ 通り)

$$1 + {}_{14}C_1 + {}_{12}C_2 + {}_{10}C_3 + {}_8C_4 + {}_6C_5 \\ = 1 + 14 + 66 + 120 + 70 + 6 \\ = \mathbf{277} \text{ (通り)}$$

2 $a_{n+1} = xa_n + y^{n+1}$ より (x, y は相異なる正の実数)

$$\frac{a_{n+1}}{x^{n+1}} - \frac{a_n}{x^n} = \left(\frac{y}{x}\right)^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$a_1 = 0, \frac{y}{x} \neq 1$ に注意して

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{a_{k+1}}{x^{k+1}} - \frac{a_k}{x^k} \right) = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{y}{x}\right)^{k+1} \quad \text{ゆえに} \quad \frac{a_n}{x^n} = \frac{y^2}{x^2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^{n-1}}{1 - \frac{y}{x}}$$

$$\text{したがって} \quad a_n = \frac{y^2(x^{n-1} - y^{n-1})}{x - y}$$

よって、求める点 (x, y) は

$$-1 < x \leq 1, \quad -1 < y \leq 1, \quad x \neq y$$

点 (x, y) の表す領域は、右の図の斜線部分と実線部分である (点線部分と $\circ$ は含まない).

3 $a + b + c + d = 0, \quad ad - bc + p = 0, \quad a \geq b \geq c \geq d \quad \dots (*)$

(*) の第 1 式から、 $d = -(a + b + c)$. これを第 2 式に代入すると

$$-a(a + b + c) - bc + p = 0 \quad \text{ゆえに} \quad (a + b)(a + c) = p \quad \dots (**)$$

$$a \geq b \geq c \geq d \text{ より} \quad a + b \geq c + d$$

(*) の第 1 式より、 $c + d = -(a + b)$ を上式に代入すると

$$a + b \geq -(a + b) \quad \text{ゆえに} \quad a + b \geq 0$$

$$(**) \text{ より} \quad a + b = p, \quad a + c = 1$$

したがって、 $b = p - a, c = 1 - a$ を (*) の第 1 式に代入すると

$$a + (p - a) + (1 - a) + d = 0 \quad \text{ゆえに} \quad d = a - p - 1$$

(*) の第 3 式により

$$a \geq p - a \geq 1 - a \geq a - p - 1 \quad \text{ゆえに} \quad \frac{p}{2} \leq a \leq \frac{p+2}{2}$$

$$p \text{ は奇素数より} \quad a = \frac{p+1}{2}, \quad b = \frac{p-1}{2}, \quad c = -\frac{p-1}{2}, \quad d = -\frac{p+1}{2}$$

別解 $a + b + c + d = 0$, $ad - bc + p = 0$ より $a + d = -(b + c)$, $ad = bc - p$

a, d を解とする 2 次方程式は $x^2 + (b + c)x + (bc - p) = 0$

これを解いて $x = \frac{-(b + c) \pm \sqrt{(b - c)^2 + 4p}}{2}$

$a \geq d$ より, $a - d = \sqrt{(b - c)^2 + 4p}$ であるから

$$(a - d)^2 = (b - c)^2 + 4p \quad \text{ゆえに} \quad (a - d + b - c)(a - d - b + c) = 4p$$

$a - d + b - c = a - d - b + c + 2(b - c)$ であるから, $a - d + b - c$ と $a - d - b + c$ の偶奇が一致することに注意して ($a \geq b \geq c \geq d$)

$$a - d + b - c = 2p, \quad a - d - b + c = 2$$

ゆえに $a - d = p + 1$, $b - c = p - 1$ $\cdots (*)$

これらを $(a - b) + (b - c) + (c - d) = a - d$ に代入すると

$$(a - b) + p - 1 + (c - d) = p + 1 \quad \text{ゆえに} \quad (a - b) + (c - d) = 2$$

$c - d = k$ とおくと ($k = 0, 1, 2$), $a - b = 2 - k$ であるから, $(*)$ より

$$a = d + p + 1, \quad b = d + p + k - 1, \quad c = d + k$$

これらを $a + b + c + d = 0$ に代入すると

$$(d + p + 1) + (d + p + k - 1) + (d + k) + d = 0 \quad \text{ゆえに} \quad d = -\frac{p + k}{2}$$

したがって

$$a = \frac{p - k + 2}{2}, \quad b = \frac{p + k - 2}{2}, \quad c = -\frac{p - k}{2}, \quad d = -\frac{p + k}{2}$$

p は奇素数, a, b, c, d は整数であるから, $k = 1$ より

$$a = \frac{p + 1}{2}, \quad b = \frac{p - 1}{2}, \quad c = -\frac{p - 1}{2}, \quad d = -\frac{p + 1}{2}$$

4 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = r$ とおくと

$$\vec{OP} = \frac{3\vec{a} + 2\vec{b}}{5}, \quad \vec{OQ} = \frac{3\vec{b} + 2\vec{c}}{5}, \quad \vec{OR} = \frac{3\vec{c} + 2\vec{a}}{5}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって} \quad 25|\vec{OP}|^2 &= 9|\vec{a}|^2 + 12\vec{a}\cdot\vec{b} + 4|\vec{b}|^2 = 13r^2 + 12\vec{a}\cdot\vec{b} \\ 25|\vec{OQ}|^2 &= 9|\vec{b}|^2 + 12\vec{b}\cdot\vec{c} + 4|\vec{c}|^2 = 13r^2 + 12\vec{b}\cdot\vec{c} \\ 25|\vec{OR}|^2 &= 9|\vec{c}|^2 + 12\vec{c}\cdot\vec{a} + 4|\vec{a}|^2 = 13r^2 + 12\vec{c}\cdot\vec{a} \end{aligned}$$

$$|\vec{OP}| = |\vec{OQ}| = |\vec{OR}| \text{ であるから } \vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{c} = \vec{c}\cdot\vec{a} \quad \dots (*)$$

$$|\vec{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{a}|^2 = 2r^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{b} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$|\vec{BC}|^2 = |\vec{c} - \vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{c} + |\vec{b}|^2 = 2r^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{c} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$|\vec{CA}|^2 = |\vec{a} - \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{c}\cdot\vec{a} + |\vec{c}|^2 = 2r^2 - 2\vec{c}\cdot\vec{a} \quad \dots \textcircled{3}$$

$$(*) \text{ および } \textcircled{1} \sim \textcircled{3} \text{ より } |\vec{AB}|^2 = |\vec{BC}|^2 = |\vec{CA}|^2$$

ゆえに $AB = BC = CA$ よって $\triangle ABC$ は正三角形 ■

5 $\vec{x}_{n+1} = A\vec{x}_n$ より ($n = 0, 1, 2, \dots$)

$$\vec{x}_m = A^m \vec{x}_0 \quad \text{条件から} \quad \vec{x}_0 = A^m \vec{x}_0 \quad \dots \textcircled{1}$$

上の第2式から

$$A\vec{x}_0 = A^{m+1}\vec{x}_0 = A^m(A\vec{x}_0) \quad \text{ゆえに} \quad \vec{x}_1 = A^m \vec{x}_1 \quad \dots \textcircled{2}$$

$k \neq 1$ とし, $\vec{x}_1 = k\vec{x}_0$ と仮定すると, $\textcircled{1}$ より

$$\vec{x}_0 = A^{m-1}(A\vec{x}_0) = A^{m-1}\vec{x}_1 = kA^{m-1}\vec{x}_0 \quad \text{ゆえに} \quad \vec{x}_0 = k^m \vec{x}_0$$

したがって $k^m = 1$ すなわち $k = -1$

このとき, $\vec{x}_1 = -\vec{x}_0$ より, $A^2\vec{x}_0 = \vec{x}_0$ となり, 条件に反する.

これから, $\vec{x}_1$ は $\vec{x}_0$ と平行ではないから, $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ より

$$A^m \begin{pmatrix} \vec{x}_0 & \vec{x}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{x}_0 & \vec{x}_1 \end{pmatrix} \quad \text{よって} \quad A^m = E$$
■

$$\boxed{6} \quad (1) \quad f(a+b) = \frac{f(a)+f(b)}{1+f(a)f(b)} \quad \dots (*)$$

(*) に $a = x$, $b = -x$ を代入すると

$$f(0) = \frac{f(x)+f(-x)}{1+f(x)f(-x)}$$

$f(0) = 0$ より $f(x)+f(-x) = 0$ すなわち $f(x)$ は奇関数

$f(c) = 1$ を満たす c が存在すると仮定すると, $f(-c) = -1$ より

$$1 + f(c)f(-c) = 0$$

これは, 与えられた条件に反するから $f(x) \neq \pm 1$

$f(x)$ が連続関数 (可微分) で, $f(0) = 0$ であることから

$$-1 < f(x) < 1$$

よって, 任意の実数 a に対して, $-1 < f(a) < 1$

(2) (*) より

$$f(x+h) - f(x) = \frac{f(x)+f(h)}{1+f(x)f(h)} - f(x) = \frac{1-f(x)^2}{1+f(x)f(h)} \cdot f(h)$$

$f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ より

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-f(x)^2}{1+f(x)f(h)} \cdot \frac{f(h) - f(0)}{h} = \{1-f(x)^2\} f'(0) \\ &= 1-f(x)^2 \quad \dots (**) \end{aligned}$$

(1) の結果から, $f'(x) > 0$ より $x > 0$ のとき $f(x) > f(0) = 0$

(**) を微分すると $f''(x) = -2f(x)f'(x)$

上式より, $x > 0$ において, $f(x) > 0$, $f'(x) > 0$ であるから

$$f''(x) < 0$$

よって, $y = f(x)$ のグラフは, $x > 0$ で上に凸である.

解説 $-1 < f(x) < 1$, $f'(x) = 1 - f(x)^2$ より

$$\frac{f'(x)}{1+f(x)} + \frac{f'(x)}{1-f(x)} = 2$$

これを積分すると

$$\log\{1+f(x)\} - \log\{1-f(x)\} = 2x + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$f(0) = 0$ より, $C = 0$ であるから

$$\log \frac{1+f(x)}{1-f(x)} = 2x \quad \text{ゆえに} \quad \frac{1+f(x)}{1-f(x)} = e^{2x} \quad \text{よって} \quad f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

■

7 (1) ハミルトン・ケーリーの定理を $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ に適用すると

$$A^2 - A + 2E = O$$

したがって

$$\begin{aligned} & A^6 + 2A^4 + 2A^3 + 2A^2 + 2A + 3E \\ &= (A^2 - A + 2E)(A^4 + A^3 + A^2 + A + E) + A + E = A + E \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2) 求める確率は

$$\frac{{}_n\text{H}_3}{n^3} = \frac{{}_{n+3-1}\text{C}_3}{n^3} = \frac{(n+2)(n+1)n}{3!n^3} = \frac{(n+2)(n+1)}{6n^2}$$

■

- 8 $\triangle ABC$ において, $\angle A = 2\alpha$, $\angle B = 2\beta$,
 $\angle C = 2\gamma$ とおくと

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ \quad \dots (*)$$

2直線 AA' と $B'C'$ の交点を P とする.
 円周角の定理により

$$\angle AC'B' = \angle ABB' = \beta$$

$$\angle BAC' = \angle BCC' = \gamma$$

$\triangle AC'P$ について

$$\angle AC'P = \beta, \quad \angle PAC' = \gamma + \alpha$$

上の2式と (*) により

$$\angle C'PA = 180^\circ - \angle AC'P - \angle PAC' = 180^\circ - \beta - (\gamma + \alpha) = 90^\circ$$

したがって, 2直線 AA' と $B'C'$ は直交する.

同様に, 2直線 BB' と $C'A'$ の交点を Q とすると, $\angle BQC' = 90^\circ$.

したがって, 2直線 BB' と $C'A'$ は直交する.

よって, H は $\triangle A'B'C'$ の垂心である. ■

- 9 1次変換 f , g の表す行列を F , G とすると

$$F = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}$$

$f \circ g$ の表す行列 FG は

$$FG = \begin{pmatrix} \cos(2\alpha + \frac{\pi}{3}) & \sin(2\alpha + \frac{\pi}{3}) \\ \sin(2\alpha + \frac{\pi}{3}) & -\cos(2\alpha + \frac{\pi}{3}) \end{pmatrix}$$

これが x 軸について対称移動を表す行列 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ に等しいから

$$\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = 1, \quad \sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

これを $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ について解くと $\alpha = -\frac{\pi}{6}$ ■

10 $xe^{1-x} - x = x(e^{1-x} - 1)$ より, 曲線 $y = e^{1-x}$ と直線 $y = x$ の交点の x 座標は

$$x = 0, 1$$

$0 \leq x \leq 1$ において $xe^{1-x} \geq x$

求める立体の体積を V とすると

$$\begin{aligned} \frac{V}{\pi} &= \int_0^1 (xe^{1-x})^2 dx - \int_0^1 x^2 dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[e^{2-2x} \left(x^2 + x + \frac{1}{2} \right) \right]_0^1 - \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{e^2}{4} - \frac{19}{12} \end{aligned}$$

よって $V = \pi \left(\frac{e^2}{4} - \frac{19}{12} \right)$

解説 部分積分法により, 次式が得られる (C は積分定数).

$$\begin{aligned} \int e^{px+q} f(x) dx &= \frac{e^{px+q}}{p} \left\{ f(x) - \frac{f'(x)}{p} + \frac{f''(x)}{p^2} - \frac{f'''(x)}{p^3} + \dots \right\} + C \\ \int a^{px+q} f(x) dx &= \frac{a^{px+q}}{p \log a} \left\{ f(x) - \frac{f'(x)}{p \log a} + \frac{f''(x)}{(p \log a)^2} - \frac{f'''(x)}{(p \log a)^3} + \dots \right\} + C \\ \int e^{-x+q} f(x) dx &= -e^{-x+q} \{ f(x) + f'(x) + f''(x) + f'''(x) + \dots \} + C \\ \int a^{-x+q} f(x) dx &= -\frac{a^{-x+q}}{\log a} \left\{ f(x) + \frac{f'(x)}{\log a} + \frac{f''(x)}{(\log a)^2} + \frac{f'''(x)}{(\log a)^3} + \dots \right\} + C \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{2-2x} dx &= \frac{e^{2-2x}}{-2} \left\{ x^2 - \frac{(x^2)'}{-2} + \frac{(x^2)''}{(-2)^2} \right\} + C \\ &= -\frac{1}{2} e^{2-2x} \left(x^2 + x + \frac{1}{2} \right) + C \end{aligned}$$

■