

令和3年度 名古屋大学 2次試験前期日程(数学問題)90分  
法・経済・文・教育・情報文化(社会システム情報)数I・II・A・B

1  $a$  の正の実数とする. 放物線  $y = x^2$  を  $C_1$ , 放物線  $y = -x^2 + 4ax - 4a^2 + 4a^4$  を  $C_2$  とする. 以下の問に答えよ.

- (1) 点  $(t, t^2)$  における  $C_1$  の接線の方程式を求めよ.
- (2)  $C_1$  と  $C_2$  が異なる2つの共通接線  $l, l'$  を持つような  $a$  の範囲を求めよ. ただし  $C_1$  と  $C_2$  の共通接線とは,  $C_1$  と  $C_2$  の両方に接する直線のことである.

以下,  $a$  は (2) で求めた範囲にあるとし,  $l, l'$  を  $C_1$  と  $C_2$  の異なる2つの共通接線とする.

- (3)  $l, l'$  の交点の座標を求めよ.
- (4)  $C_1$  と  $l, l'$  で囲まれた領域を  $D_1$  とし, 不等式  $x \leq a$  の表す領域を  $D_2$  とする.  $D_1$  と  $D_2$  の共通部分の面積  $S(a)$  を求めよ.

2 4つの実数を  $\alpha = \log_2 3$ ,  $\beta = \log_3 5$ ,  $\gamma = \log_5 2$ ,  $\delta = \frac{3}{2}$  とおく. 以下の問に答えよ.

- (1)  $\alpha\beta\gamma = 1$  を示せ.
- (2)  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  を小さい順に並べよ.
- (3)  $p = \alpha + \beta + \gamma$ ,  $q = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$  とし,  $f(x) = x^3 + px^2 + qx + 1$  とする. このとき  $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ ,  $f(-1)$  および  $f\left(-\frac{3}{2}\right)$  の正負を判定せよ.

**3** 1から12までの数字が下の図のように並べて書かれている．以下のルール (a), (b) と (終了条件) を用いたゲームを行う．ゲームを開始すると最初に (a) を行い, (終了条件) が満たされたならゲームを終了する．そうでなければ (終了条件) が満たされるまで (b) の操作を繰り返す．ただし, (a) と (b) における数字を選ぶ操作はすべて独立な試行とする．

(a) 1から12までの数字のどれか1つを等しい確率で選び, 下の図において選んだ数字を丸で囲み, その上に石を置く．

(b) 石が置かれた位置の水平右側または垂直下側の位置にある数字のどれか1つを等しい確率で選び, その数字を丸で囲み, そこに石を移して置く．例えば, 石が6の位置に置かれているときは, その水平右側または垂直下側の位置にある数字7, 8, 9, 10, 12のどれか1つの数字を等しい確率で選び, その数字を丸で囲み, そこに石を移して置く．

(終了条件) 5, 9, 11, 12の数字のどれか1つが丸で囲まれ石が置かれている．

ゲームの終了時に数字  $j$  が丸で囲まれている確率を  $p_j$  とする．以下の間に答えよ．

1	2	3	4	5
6	7	8	9	
10	11			
12				

(1) 確率  $p_2$  を求めよ．

(2) 確率  $p_5$  を求めよ．

(3) 確率  $p_{11}$  を求めよ．

## 解答例

$$\boxed{1} \quad (1) \quad C_1: y = x^2 \text{ より } y' = 2x$$

$C_1$  上の点  $(t, t^2)$  における接線の方程式は

$$y - t^2 = 2t(x - t) \quad \text{すなわち} \quad y = 2tx - t^2$$

(2) (1) で求めた接線と  $C_2: y = -x^2 + 4ax - 4a^2 + 4a^4$  から  $y$  を消去すると

$$2tx - t^2 = -x^2 + 4ax - 4a^2 + 4a^4$$

これを  $x$  について整理すると

$$x^2 + 2(t - 2a)x + 4a^2 - 4a^4 - t^2 = 0$$

このとき、上の  $x$  の 2 次方程式は重解をもつから、係数について

$$D/4 = (t - 2a)^2 - (4a^2 - 4a^4 - t^2) = 0$$

これを  $t$  について整理すると  $t^2 - 2at + 2a^4 = 0 \quad \dots (*)$

$C_1$  と  $C_2$  が異なる 2 つの共通接線  $l, l'$  をもつとき、その 2 つの接点の  $x$  座標、すなわち、2 次方程式  $(*)$  の解が異なる 2 つの実数解をもつから、係数について

$$D/4 = (-a)^2 - 2a^4 = a^2(1 - 2a^2) > 0$$

$a > 0$  に注意してこれを解くと  $0 < a < \frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) 2 次方程式  $(*)$  の異なる 2 つの実数解  $p, q$  と係数の関係により

$$(**) \quad p + q = 2a, \quad pq = 2a^4$$

$C_1$  上の 2 点  $(p, p^2), (q, q^2)$  における接線をそれぞれ  $l, l'$  とすると、(1) の結果から

$$l: y = 2px - p^2, \quad l': y = 2qx - q^2$$

$l, l'$  の交点の座標は  $\left(\frac{p+q}{2}, pq\right)$  すなわち  $(a, 2a^4)$


(4)  $p < q$  とすると,  $D_1$  と  $D_2$  の共通部分の面積  $S(a)$  は

$$\begin{aligned} S(a) &= \int_p^a \{x^2 - (2px - p^2)\} dx = \int_p^a (x - p)^2 dx \\ &= \frac{1}{3} \left[ (x - p)^3 \right]_p^a = \frac{1}{3} (a - p)^3 \end{aligned}$$

$$2a = p + q \text{ より } S(a) = \frac{1}{3} \left( \frac{q - p}{2} \right)^3$$

$$(**) \text{ より } (q - p)^2 = (p + q)^2 - 4pq = (2a)^2 - 4 \cdot 2a^4 = 4(a^2 - 2a^4)$$

$$p < q \text{ より } \frac{q - p}{2} = \sqrt{a^2 - 2a^4} \quad \text{よって } S(a) = \frac{1}{3} (a^2 - 2a^4)^{\frac{3}{2}}$$



**2** (1)  $\alpha = \log_2 3$ ,  $\beta = \log_3 5$ ,  $\gamma = \log_5 2$  より

$$\alpha\beta\gamma = \log_2 3 \log_3 5 \log_5 2 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \frac{\log_2 2}{\log_2 5} = 1$$

補足 積における真数の交換法則  $\log_a A \log_b B = \log_a B \log_b A$  を用いると

$$\begin{aligned} \alpha\beta\gamma &= \log_2 3 \log_3 5 \log_5 2 = \log_2 5 \log_3 3 \log_5 2 \\ &= \log_2 5 \log_5 2 = \log_2 2 \log_5 5 = 1 \end{aligned}$$

(2)  $\alpha = \log_2 3$ ,  $\beta = \log_3 5$ ,  $\gamma = \log_5 2$ ,  $\delta = \frac{3}{2}$  より

$$\log_5 2 < 1 < \log_3 5 < \log_3 \sqrt{27} = \frac{3}{2} = \log_2 \sqrt{8} < \log_2 3$$

よって  $\gamma < \beta < \delta < \alpha$

(3) (1) の結果から

$$q = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma} = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha \quad (*)$$

また,  $p = \alpha + \beta + \gamma$ ,  $\alpha\beta\gamma = 1$  であるから

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + px^2 + qx + 1 \\ &= x^3 + (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x + \alpha\beta\gamma \\ &= (x + \alpha)(x + \beta)(x + \gamma) \end{aligned} \quad (**)$$

$$\log_5 2 < \log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2} \text{ および } (*) \text{ から } \gamma < \frac{1}{2} < 1 < \beta < \frac{3}{2} < \alpha$$

$$-\alpha < -\frac{3}{2} < -\beta < -1 < -\frac{1}{2} < -\gamma$$

$$(**) \text{ より } f\left(-\frac{1}{2}\right) < 0, f(-1) < 0, f\left(-\frac{3}{2}\right) > 0$$

**3**  $i = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10$  とし,  $i$  の位置にある石が移動可能なそれぞれの位置に移動する確率を  $q_i$  とすると

$$q_1 = \frac{1}{7}, \quad q_2 = q_6 = \frac{1}{5}, \quad q_3 = q_7 = \frac{1}{3}, \quad q_4 = \frac{1}{2}, \quad q_8 = 1, \quad q_{10} = \frac{1}{2}$$

(1)  $p_1 = \frac{1}{12}$  であるから, 求める確率  $p_2$  は

$$p_2 = p_1 q_1 + \frac{1}{12} = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{12} = \frac{2}{21}$$

(2) (1) の結果を利用して

$$\begin{aligned} p_3 &= p_1 q_1 + p_2 q_2 + \frac{1}{12} = p_2 + p_2 q_2 = p_2(1 + q_2) \\ &= \frac{2}{21} \left(1 + \frac{1}{5}\right) = \frac{4}{35} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_4 &= p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3 + \frac{1}{12} = p_3 + p_3 q_3 = p_3(1 + q_3) \\ &= \frac{4}{35} \left(1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{16}{105} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_5 &= p_1 q_1 + p_2 q_2 + p_3 q_3 + p_4 q_4 + \frac{1}{12} = p_4 + p_4 q_4 = p_4(1 + q_4) \\ &= \frac{16}{105} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{8}{35} \end{aligned}$$

(3) (1),(2) の結果を利用して

$$p_6 = p_1 q_1 + \frac{1}{12} = p_2$$

$$\begin{aligned} p_7 &= p_2 q_2 + p_6 q_6 + \frac{1}{12} = p_2 q_2 + p_2 q_2 + \frac{1}{12} = 2p_2 q_2 + \frac{1}{12} \\ &= 2 \cdot \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{12} = \frac{17}{140} \end{aligned}$$

$$p_{10} = p_1 q_1 + p_6 q_6 + \frac{1}{12} = p_1 q_1 + p_2 q_2 + \frac{1}{12} = p_3 = \frac{4}{35}$$

$$\begin{aligned} p_{11} &= p_2 q_2 + p_7 q_7 + p_{10} q_{10} + \frac{1}{12} \\ &= \frac{2}{21} \cdot \frac{1}{5} + \frac{17}{140} \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{35} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$