平成16年度 名古屋大学 2次試験前期日程(数学問題)150分
理・工・農・医・情報文化(自然情報) 数I・II・III・A・B・C

問題 1 2 3 必答, 4 5 から1題選択

1 サイコロの出た目の数だけ数直線を正の方向に移動するゲームを考える。ただし, 8をゴールとしてちょうど8の位置へ移動したときにゲームは終了し, 8をこえた分についてはその数だけ戻る。たとえば, 7の位置で3が出た場合, 8から2戻って6へ移動する。なお, サイコロは1から6までの目が等確率で出るものとする。原点から始めて, サイコロを n 回投げ終えたときに8へ移動してゲームを終了する確率を p_n とおく。

- (1) p_2 を求めよ。
- (2) p_3 を求めよ。
- (3) 4以上のすべての n に対して p_n を求めよ。

2 a, b, c を実数とし, 実数の組 (x, y, z) に関する方程式

$$(i) \begin{cases} x + y - 2z = 3a \\ 2x - y - z = 3b \\ x - 5y + 4z = 3c \end{cases} \quad \text{および} \quad (ii) \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

を考える。

- (1) 方程式 (i) が解をもつための a, b, c に対する条件を求めよ。またそのときの方程式 (i) の解 (x, y, z) を求めよ。
- (2) 方程式 (i) と (ii) がただ一つの共通解をもつとき, その共通解 (x, y, z) は方程式 $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ をみたすことを示せ。

3 多項式の列 $f_n(x)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ が, $f_0(x) = 2$, $f_1(x) = x$,

$$f_n(x) = xf_{n-1}(x) - f_{n-2}(x), \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

をみたすとする。

- (1) $f_n(2 \cos \theta) = 2 \cos n\theta$, $n = 0, 1, 2, \dots$ であることを示せ。
- (2) $n \geq 2$ のとき, 方程式 $f_n(x) = 0$ の $|x| \leq 2$ における最大の実数解を x_n とおく。このとき, $\int_{x_n}^2 f_n(x) dx$ の値を求めよ。
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_{x_n}^2 f_n(x) dx$ の値を求めよ。

4 C_1, C_2, C_3 は、半径がそれぞれ $a, a, 2a$ の円とする。いま、半径1の円 C にこれらが内接していて、 C_1, C_2, C_3 は互いに外接しているとき、 a の値を求めよ。

5 正の整数 a と b が互いに素であるとき、正の整数からなる数列 $\{x_n\}$ を

$$x_1 = x_2 = 1, \quad x_{n+1} = ax_n + bx_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

で定める。このときすべての正の整数 n に対して x_{n+1} と x_n が互いに素であることを示せ。

解答例

- 1** (1) 1回目に出た目を x_1 , 2回目に出た目を x_2 とすると, 2回目で終了するとき, $x_1 + x_2 = 8$ となる次の5組である.

$$(x_1, x_2) = (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)$$

よって, 求める確率は $\frac{5}{6^2} = \frac{5}{36}$

- (2) 2回目で終了しないとき, その時点の数直線上の座標は2~7の6通り.
2回目で終了しないときに3回目で終了する確率(条件付き確率)が $\frac{1}{6}$ であるから, 3回目で終了する確率は

$$(1 - p_2) \times \frac{1}{6} = \left(1 - \frac{5}{36}\right) \times \frac{1}{6} = \frac{31}{216}$$

- (3) (2)の考察から

$$3\text{回目で終了しない確率は } (1 - p_2) \times \frac{5}{6}$$

$$4\text{回目で終了しない確率は } (1 - p_2) \times \left(\frac{5}{6}\right)^2$$

⋮

$$n - 1\text{回目で終了しない確率は } (1 - p_2) \times \left(\frac{5}{6}\right)^{n-3}$$

よって, n 回目で終了する確率は ($n \geq 4$)

$$(1 - p_2) \left(\frac{5}{6}\right)^{n-3} \times \frac{1}{6} = \frac{31}{6^2} \times \frac{5^{n-3}}{6^{n-3}} \times \frac{1}{6} = \frac{31 \cdot 5^{n-3}}{6^n}$$

$$\boxed{2} \quad (1) \quad (i) \quad \begin{cases} x + y - 2z = 3a \\ 2x - y - z = 3b \\ x - 5y + 4z = 3c \end{cases} \quad \text{および} \quad (ii) \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

(i) の第 1 式と第 2 式の辺々を加えると

$$3x - 3z = 3a + 3b \quad \text{ゆえに} \quad x = z + a + b \quad \dots \textcircled{1}$$

① を (i) の第 1 式に代入すると

$$(z + a + b) + y - 2z = 3a \quad \text{ゆえに} \quad y = z + 2a - b \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② を (i) の第 3 式に代入すると

$$(z + a + b) - 5(z + 2a - b) + 4z = 3c \quad \text{ゆえに} \quad -9a + 6b = 3c$$

よって, (i) が解をもつための条件は $c = -3a + 2b$

また, ①, ② より $x - a - b = y - 2a + b = z$

$z = t$ とおくと (t は実数), 方程式 (i) の解は

$$x = t + a + b, \quad y = t + 2a - b, \quad z = t \quad (t \text{ は任意の実数})$$

(2) (1) の結果を (ii) に代入すると

$$(t + a + b)^2 + (t + 2a - b)^2 + t^2 = 1$$

t について整理すると

$$3t^2 + 6at + 5a^2 - 2ab + 2b^2 - 1 = 0 \quad (*)$$

(i) と (ii) がただ一つの共通解をもつとき, t の 2 次方程式 (*) は重解をもつから, その係数について

$$D/4 = (3a)^2 - 3(5a^2 - 2ab + 2b^2 - 1) = 0$$

したがって $2a^2 - 2ab + 2b^2 = 1 \quad \dots \textcircled{3}$

このとき, (*) の解は $t = -\frac{6a}{2 \cdot 3} = -a$

これを (1) の結果に代入して $x = b, y = a - b, z = -a$

よって, 共通解 (x, y, z) は ③ により, 次式を満たす.

$$\begin{aligned} 2x^2 + 2xy + 2y^2 &= 2b^2 + 2b(a - b) + 2(a - b)^2 \\ &= 2a^2 - 2ab + 2b^2 = 1 \end{aligned}$$

3 (1) 多項式の列 $f_n(x)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ が,

$$\begin{aligned} f_0(x) &= 2, & f_1(x) &= x, \\ f_n(x) &= x f_{n-1}(x) - f_{n-2}(x), & n &= 2, 3, 4, \dots \end{aligned}$$

をみたすとき

$$f_n(2 \cos \theta) = 2 \cos n\theta \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (\text{A})$$

とする.

[1] $n = 0, 1$ のとき, (A) は成立する.

[2] $n \leq k$ のとき, (A) が成立すると仮定すると

$$\begin{aligned} \cos(k+1)\theta &= \cos(k\theta + \theta) \\ &= \cos k\theta \cos \theta - \sin k\theta \sin \theta \\ \cos(k-1)\theta &= \cos(k\theta - \theta) \\ &= \cos k\theta \cos \theta + \sin k\theta \sin \theta \end{aligned}$$

上の2式の辺々を加えると

$$\cos(k+1)\theta + \cos(k-1)\theta = 2 \cos k\theta \cos \theta$$

したがって $\cos(k+1)\theta = 2 \cos \theta \cos k\theta - \cos(k-1)\theta$

(A) および定義された漸化式により

$$\begin{aligned} 2 \cos(k+1)\theta &= 2 \cos \theta \cdot 2 \cos k\theta - 2 \cos(k-1)\theta \\ &= (2 \cos \theta) f_k(2 \cos \theta) - f_{k-1}(2 \cos \theta) \\ &= f_{k+1}(2 \cos \theta) \end{aligned}$$

よって, $n = k+1$ のときも (A) は成立する.

[1], [2] より, すべての自然数 n について, (A) は成立する.

補足 定義された漸化式により, $f_n(x)$ は, x の n 次多項式である.

(2) $|x| \leq 2$ より, $x = 2 \cos \theta$ とおくと, (1) の結果より, 方程式

$$f_n(x) = 0 \quad \text{すなわち} \quad 2 \cos n\theta = 0$$

の最大の実数解 x_n は, $n\theta = \frac{\pi}{2}$ より $x_n = 2 \cos \frac{\pi}{2n}$

$$x = 2 \cos \theta \quad \text{より} \quad \frac{dx}{d\theta} = -2 \sin \theta \quad \begin{array}{|l} x \\ \theta \end{array} \begin{array}{|l} x_n \longrightarrow 2 \\ \frac{\pi}{2n} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \int_{x_n}^2 f(x) dx &= \int_{\frac{\pi}{2n}}^0 f(2 \cos \theta) \cdot (-2 \sin \theta) d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2n}} 2 \cos n\theta \sin \theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \{\sin(n+1)\theta - \sin(n-1)\theta\} d\theta \\ &= 2 \left[-\frac{1}{n+1} \cos(n+1)\theta + \frac{1}{n-1} \cos(n-1)\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2n}} \\ &= -\frac{2}{n+1} \left(\cos \frac{n+1}{2n} \pi - 1 \right) + \frac{2}{n-1} \left(\cos \frac{n-1}{2n} \pi - 1 \right) \\ &= -\frac{2}{n+1} \left(-\sin \frac{\pi}{2n} - 1 \right) + \frac{2}{n-1} \left(\sin \frac{\pi}{2n} - 1 \right) \\ &= \frac{4}{n^2 - 1} \left(n \sin \frac{\pi}{2n} - 1 \right) \end{aligned}$$

(3) (2) の結果および $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\pi} \sin \frac{\pi}{2n} = 1$ より

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_{x_n}^2 f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2}{n^2 - 1} \left(n \sin \frac{\pi}{2n} - 1 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{1 - \frac{1}{n^2}} \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{2n}{\pi} \sin \frac{\pi}{2n} - 1 \right) \\ &= 4 \left(\frac{\pi}{2} \cdot 1 - 1 \right) = 2\pi - 4 \end{aligned}$$

補足 [a] を a 以下の最大の整数とすると

$$\begin{aligned} \cos n\theta &= \frac{1}{2} \{ (\cos \theta + i \sin \theta)^n + (\cos \theta - i \sin \theta)^n \} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n C_{2k} \{ i^{2k} + (-i)^{2k} \} \cos^{n-2k} \theta \sin^{2k} \theta \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n C_{2k} (-1)^k \cos^{n-2k} \theta (1 - \cos^2 \theta)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n C_{2k} \cos^{n-2k} \theta (\cos^2 \theta - 1)^k \end{aligned}$$

4 C_1, C_2, C_3 の中心をそれぞれ O_1, O_2, O_3 とすると

$$OO_1 = 1 - 2a, \quad OO_2 = 1 - a, \quad O_1O_2 = 3a$$

C_1 と C_2 の接点を T とし, $\theta = \angle TO_1O_2$ とすると

$$\sin \theta = \frac{O_2T}{O_1O_2} = \frac{a}{3a} = \frac{1}{3} \quad \text{ゆえに} \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$\triangle OO_1O_2$ に余弦定理を適用すると

$$OO_2^2 = OO_1^2 + O_1O_2^2 - 2OO_1 \cdot O_1O_2 \cos \theta$$

したがって $(1 - a)^2 = (1 - 2a)^2 + (3a)^2 - 2(1 - 2a) \cdot 3a \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3}$

整理すると $2(3 + 2\sqrt{2})a^2 = (1 + 2\sqrt{2})a$

$a \neq 0$ より $a = \frac{1 + 2\sqrt{2}}{2(3 + 2\sqrt{2})} = \frac{4\sqrt{2} - 5}{2}$

5 正の整数 a と b が互いに素であるとき

$$x_1 = x_2 = 1, \quad x_{n+1} = ax_n + bx_{n-1} \quad (n \geq 2) \quad (*)$$

で定義された正の整数からなる数列 $\{x_n\}$ について、先ず次を示す.

(A) $\{x_n\}$ は整数 b と互いに素である.

条件から、 $n = 1, 2$ のとき、(A) は成立する.

$n = k + 1$ で初めて (A) が成立しない、すなわち、 x_{k+1} と b が互いに素でないと仮定すると、(*) より

$$x_{k+1} = ax_k + bx_{k-1} \quad \text{ゆえに} \quad x_{k+1} - bx_{k-1} = ax_k$$

整数 a と b は互いに素であるから、上の第2式から x_k がすでに b と互いに素でないので仮定に反し、矛盾. よって、(A) は成立する.

x_1 と x_2 は互いに素である.

$n = m$ のとき初めて x_m と x_{m+1} が互いに素でないと仮定すると ($m \geq 2$)

$$\begin{aligned} & x_m \text{ と } ax_m + bx_{m-1} \text{ は互いに素でない} \\ \implies & x_m \text{ と } bx_{m-1} \text{ は互いに素でない} \\ \text{(A) より} \implies & x_m \text{ と } x_{m-1} \text{ は互いに素でない} \end{aligned}$$

これは仮定に反し、矛盾.

よって、すべての自然数 n について、 x_n と x_{n+1} は互いに素である.

補足 (B) $\{x_n\}$ は整数 a と互いに素である.

条件から、 $n = 1, 2$ のとき、(B) は成立する.

$n = k + 1$ で初めて (B) が成立しない、すなわち、 x_{k+1} と a が互いに素でないと仮定すると、(*) より

$$x_{k+1} = ax_k + bx_{k-1} \quad \text{ゆえに} \quad x_{k+1} - ax_k = bx_{k-1}$$

整数 a と b は互いに素であるから、上の第2式から x_{k-1} がすでに b と互いに素でないので仮定に反し、矛盾. よって、(B) は成立する. ■