平成13年度 大阪大学 2次試験前期日程 (数学問題)90分
文・法・経済・医(看護)・外国語・人間科学 数I・II・A・B

問題 1 2 3

- 1 座標平面上の4点 $A(1, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 8)$, $D(1, 8)$ を頂点とする長方形を R とする. また $0 < t < 4$ に対し, 原点 $O(0, 0)$, 点 $E(4, 0)$, および点 $P(t, 8t - 2t^2)$ の3点を頂点とする三角形を $T(t)$ とする.

- (1) R の内部と $T(t)$ の内部との共通部分の面積 $f(t)$ を求めよ.
(2) t が $0 < t < 4$ の範囲で動くとき, $f(t)$ を最大にする t の値と, そのときの最大値を求めよ.

- 2 空間のベクトル $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$, $\vec{y} = (y_1, y_2, y_3)$ を考える. ただし, どちらも零ベクトルではないとする. $k = 1, 2, 3$ に対し, 複素数

$$z_k = x_k + y_k i \quad (i = \sqrt{-1} \text{は虚数単位})$$

を考え, 複素数 $w_k = u_k + v_k i$ (u_k, v_k は実数) を

$$w_k = (\sqrt{3} + i)z_k$$

で定める. さらに u_k, v_k から定まるベクトル

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3), \quad \vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

を考える.

- (1) $\vec{x}$ の大きさを r , $\vec{y}$ の大きさを s , $\vec{x}$ と $\vec{y}$ のなす角を θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) とするとき $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ を r, s, θ で表せ.
(2) $\vec{x}$ と $\vec{y}$ の大きさが等しく, 両者はたがいに垂直であるとする. このとき $\vec{u}$ と $\vec{v}$ も大きさが等しく, たがいに垂直であることを示せ.
(3) (2) の仮定のもとで, $\vec{x}$ と $\vec{u}$ のなす角を求めよ.

- 3 各整数 k に対し, 座標平面上の点

$$P_k \left(\frac{k}{500}, 0 \right), \quad Q_k \left(\frac{k}{500}, 1 \right)$$

をとり, 3点 P_{k-1}, P_k, Q_k を頂点とする三角形 T_k を考える. また, 各自然数 n に対し

$$f_n(x) = 2 \times 10^{-nx}$$

とおく. 曲線 $y = f_n(x)$ 上の動点 R が, 点 $(0, 2)$ から出発して x 座標が大きくなる方向に動くとき, 三角形 T_k のうち, R が最初にその内部を通過するものが T_8 となるような n をすべて求めよ. ただし, $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする.

解答例

- 1 (1) $O(0, 0)$, $E(4, 0)$, $P(t, 8t - 2t^2)$ について ($0 < t < 4$)

$$\text{直線 OP : } y = (8 - 2t)x, \quad \text{直線 EP : } y = -2t(x - 4)$$

直線 EP と 2 直線 $x = 1$, $x = 2$ との交点の y 座標は, それぞれ

$$6t, 4t$$

直線 OP と 2 直線 $x = 1$, $x = 2$ との交点の y 座標は, それぞれ

$$8 - 2t, 16 - 4t$$

(i) $0 < t < 1$ のとき $f(t) = \frac{1}{2}(6t + 4t) \cdot 1 = 5t$

(ii) $1 \leq t \leq 2$ のとき

$$f(t) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (8t - 2t^2) - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (8 - 2t) - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4t = -4t^2 + 13t - 4$$

(iii) $2 < t < 4$ のとき $f(t) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (8 - 2t) + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (16 - 4t) = 12 - 3t$

(i)~(iii) より $f(t) = \begin{cases} 5t & (0 < t < 1) \\ -4t^2 + 13t - 4 & (1 \leq t \leq 2) \\ 12 - 3t & (2 < t < 4) \end{cases}$

(i) $0 < t < 1$

(ii) $1 \leq t \leq 2$

(iii) $2 < t < 4$

(2) $1 \leq t \leq 2$ のとき $f(t) = -4 \left(t - \frac{13}{8} \right)^2 + \frac{105}{16}$

(i)~(iii) より, $f(t)$ は, $t = \frac{13}{8}$ で最大値 $\frac{105}{16}$ をとる. ■

2 (1) $z_k = x_k + y_k i$ より ($k = 1, 2, 3$)

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^3 z_k^2 &= \sum_{k=1}^3 (x_k + y_k i)^2 = \sum_{k=1}^3 (x_k^2 - y_k^2 + 2x_k y_k i) \\
 &= \sum_{k=1}^3 x_k^2 - \sum_{k=1}^3 y_k^2 + 2i \sum_{k=1}^3 x_k y_k \\
 &= |\vec{x}|^2 - |\vec{y}|^2 + 2i |\vec{x}| |\vec{y}| \cos \theta \\
 &= \mathbf{r^2 - s^2 + 2irs \cos \theta}
 \end{aligned}$$

(2) $(u_k + v_k i) = (\sqrt{3} + i)(x_k + y_k i)$ より ($k = 1, 2, 3$)

$$\begin{aligned}
 u_k + v_k i &= (\sqrt{3} + i)(x_k + y_k i) \\
 &= \sqrt{3}x_k - y_k + (x_k + \sqrt{3}y_k)i
 \end{aligned}$$

したがって $u_k = \sqrt{3}x_k - y_k$, $v_k = x_k + \sqrt{3}y_k$ ($k = 1, 2, 3$)

$$\begin{aligned}
 |\vec{u}|^2 &= \sum_{k=1}^3 u_k^2 = \sum_{k=1}^3 (\sqrt{3}x_k - y_k)^2 \\
 &= 3 \sum_{k=1}^3 x_k^2 + \sum_{k=1}^3 y_k^2 - 2\sqrt{3} \sum_{k=1}^3 x_k y_k \\
 &= 3|\vec{x}|^2 + |\vec{y}|^2 - 2\sqrt{3} \vec{x} \cdot \vec{y}, \\
 |\vec{v}|^2 &= \sum_{k=1}^3 v_k^2 = \sum_{k=1}^3 (x_k + \sqrt{3}y_k)^2 \\
 &= \sum_{k=1}^3 x_k^2 + 3 \sum_{k=1}^3 y_k^2 + 2\sqrt{3} \sum_{k=1}^3 x_k y_k \\
 &= |\vec{x}|^2 + 3|\vec{y}|^2 + 2\sqrt{3} \vec{x} \cdot \vec{y}, \\
 \vec{u} \cdot \vec{v} &= \sum_{k=1}^3 u_k v_k = \sum_{k=1}^3 (\sqrt{3}x_k - y_k)(x_k + \sqrt{3}y_k) \\
 &= \sqrt{3} \sum_{k=1}^3 x_k^2 - \sqrt{3} \sum_{k=1}^3 y_k^2 + 2 \sum_{k=1}^3 x_k y_k \\
 &= \sqrt{3}(|\vec{x}|^2 - |\vec{y}|^2) + 2\vec{x} \cdot \vec{y}
 \end{aligned}$$

$$|\vec{x}| = |\vec{y}|, \quad \vec{x} \cdot \vec{y} = 0 \quad \text{より} \quad |\vec{u}| = |\vec{v}|, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

(3) (2)の結果から $|\vec{u}| = 2|\vec{x}|$

$$\begin{aligned}\vec{x} \cdot \vec{u} &= \sum_{k=1}^3 x_k u_k = \sum_{k=1}^3 x_k (\sqrt{3}x_k - y_k) \\ &= \sqrt{3} \sum_{k=1}^3 x_k^2 - \sum_{k=1}^3 x_k y_k = \sqrt{3} |\vec{x}|^2\end{aligned}$$

$\vec{x}$ と $\vec{u}$ のなす角を φ とすると

$$\cos \varphi = \frac{\vec{x} \cdot \vec{u}}{|\vec{x}| |\vec{u}|} = \frac{\sqrt{3} |\vec{x}|^2}{2 |\vec{x}|^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{よって} \quad \varphi = \frac{\pi}{6}$$

3 $P_k \left(\frac{k}{500}, 0 \right), Q_k \left(\frac{k}{500}, 1 \right),$

$f_n(x) = 2 \times 10^{-nx}$ について

$$f_n \left(\frac{7}{500} \right) \geq 1 \quad \text{かつ} \quad f_n \left(\frac{8}{500} \right) < 1$$

を満たせばよいから

$$2 \times 10^{-\frac{7n}{500}} \geq 1 \quad \text{かつ} \quad 2 \times 10^{-\frac{8n}{500}} < 1$$

したがって $10^{\frac{7n}{500}} \leq 2$ かつ $10^{\frac{8n}{500}} > 2$

2式の辺々の常用対数をとると

$$\frac{7n}{500} \leq \log_{10} 2 \quad \text{かつ} \quad \frac{8n}{500} > \log_{10} 2$$

上の2式から $\frac{500 \log_{10} 2}{8} < n \leq \frac{500 \log_{10} 2}{7} \dots (*)$

ここで $\log_{10} 2 = 0.3010$ より $\frac{500 \log_{10} 2}{8} = 18.8125, \quad \frac{500 \log_{10} 2}{7} = 21.5$

よって, (*) を満たす自然数 n は $n = 19, 20, 21$