平成13年度 大阪大学 2次試験前期日程(数学問題)150分
理・工・基礎工学・医・歯・薬学部 数I・II・III・A・B・C

問題 1 2 3 4 5

1 2つの複素数 $z = x + yi$, $w = u + vi$ (x, y, u, v は実数, $i = \sqrt{-1}$ は虚数単位) に対し, $x \geq u$ と $y \geq v$ がともに成り立つとき, $z \gg w$ と書くことにする.

(1) 次の条件

$$z^2 \gg 3 \quad \text{かつ} \quad \bar{z} \gg -\frac{5}{z}$$

をみたす複素数 z の範囲を求め, 複素数平面上に図示せよ. ただし, $\bar{z}$ は z に共役な複素数とする.

(2) (1) で求めた範囲を z が動くとき, 絶対値 $|z - 3i|$ の最小値, および最小値をあたえる z を求めよ.

2 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2$ とおく. 曲線 $y = f(x)$ に点 $(0, a)$ から接線がただひとつ引けるとし, しかもその接線はただ1点でこの曲線に接するとする. このときの a の値を求めよ.

3 半径1の円周上に, $4n$ 個の点 $P_0, P_1, \dots, P_{4n-1}$ が, 反時計回りに等間隔に並んでいるとする. ただし, n は自然数である.

(1) 線分 P_0P_k の長さが $\sqrt{2}$ 以上となる k の範囲を求めよ.

(2) 点 $P_0, P_1, \dots, P_{4n-1}$ のうちの相異なる3点を頂点に持つ三角形のうち, 各辺の長さがすべて $\sqrt{2}$ 以上になるものの個数 $g(n)$ を求めよ.

4 関数 $f(x) = 4 \cos^2 x - 8 \cos x + 3$ を考える. n, k を自然数とし

$$g_n(k) = f\left(\frac{\pi}{3n}\right) + f\left(\frac{2\pi}{3n}\right) + \dots + f\left(\frac{k\pi}{3n}\right)$$

とおく. ただし $n \geq 2$ とする.

(1) n を固定する. $2 \leq k \leq 3n$ の範囲で $g_n(k-1) \geq g_n(k)$ となる k をすべて求めよ. また, k が $1 \leq k \leq 3n$ の範囲を動くとき, $g_n(k)$ を最小とする k をすべて求めよ.

(2) (1) における $g_n(k)$ の最小値を G_n とする. このとき極限值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{n}$$

を求めよ.

- 5 数列 $\{a_n\}$ において、各項 a_n が $a_n \geq 0$ をみたし、かつ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2}$ が成り立つとする。さらに各 n に対し

$$b_n = (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)$$

$$c_n = 1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

とおく。

- (1) すべての n に対し不等式 $b_n \geq c_n$ が成り立つことを、数学的帰納法で示せ。
- (2) ある n について $b_{n+1} = c_{n+1}$ が成り立てば、 $b_n = c_n$ となることを示せ。
- (3) $b_3 = \frac{1}{2}$ となるとき、 $c_3 = \frac{1}{2}$ であることを示せ。また $b_3 = \frac{1}{2}$ となる数列 $\{a_n\}$ は全部で何種類あるかを求めよ。

解答例

$$\boxed{1} \quad (1) \quad z = x + yi \text{ とおくと } z^2 = (x + yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi,$$

$$\begin{aligned} \bar{z} &= x - yi, \\ -\frac{5}{\bar{z}} &= -\frac{5}{|z|^2}z = -\frac{5}{x^2 + y^2}(x + yi) \end{aligned}$$

$z \gg 3$ より

$$\begin{cases} x^2 - y^2 \geq 3 \\ 2xy \geq 0 \end{cases} \quad \text{すなわち} \quad \begin{cases} x^2 - y^2 \geq 3 & \dots \textcircled{1} \\ xy \geq 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\bar{z} \gg -\frac{5}{\bar{z}}$ より

$$\begin{cases} x \geq -\frac{5x}{x^2 + y^2} \\ -y \geq -\frac{5y}{x^2 + y^2} \end{cases} \quad \text{すなわち} \quad (*) \quad \begin{cases} \frac{x(x^2 + y^2 + 5)}{x^2 + y^2} \geq 0 & \dots \textcircled{3} \\ \frac{y(x^2 + y^2 - 5)}{x^2 + y^2} \leq 0 & \dots \textcircled{4} \end{cases}$$

(*) より, $(x, y) \neq (0, 0)$

(i) $x = 0, y \neq 0$ のとき, ① より 不適

(ii) $x \neq 0, y = 0$ のとき, ①, ③ より, それぞれ

$$x^2 \geq 3, x \geq 0 \quad \text{ゆえに} \quad x \geq \sqrt{3}, y = 0$$

(iii) $xy \neq 0$ のとき, ③ より $x > 0$ さらに ② より $y > 0$
これと ①, ④ より

$$x > 0, y > 0, x^2 - y^2 \geq 3, x^2 + y^2 \leq 5$$

(ii), (iii) から, 求める領域は下の図の斜線部分 (境界線を含む) および $x \geq \sqrt{3}$ を満たす x 軸上の点である.

(2) $z = x + yi$ とおく. このとき,

$$x = \sqrt{y^2 + 3} \quad (0 \leq y \leq 1)$$

を満たす点について調べればよいから

$$\begin{aligned} |z - 3i|^2 &= x^2 + (y - 3)^2 \\ &= (y^2 + 3) + (y - 3)^2 \\ &= 2\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{15}{2} \end{aligned}$$

よって, $y = 1$, すなわち, $z = 2 + i$ のとき, 最小値 $2\sqrt{2}$ をとる. ■

2 $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2$ より $f'(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x$

$$f''(x) = 12x^2 + 6x - 6 = 6(x+1)(2x-1)$$

曲線 $y = f(x)$ の点 $(t, f(t))$ における接線の方程式は

$$y - f(t) = f'(t)(x - t)$$

この接線が点 $(0, a)$ を通るから

$$a - f(t) = -tf'(t) \quad \text{ゆえに} \quad a = f(t) - tf'(t)$$

$g(t) = f(t) - tf'(t)$ とすると

$$g'(t) = -tf''(t) = -6t(t+1)(2t-1)$$

t	...	-1	...	0	...	$\frac{1}{2}$	...
$g'(t)$	+	0	-	0	+	0	-
$g(t)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{5}{16}$	$\searrow$

よって、方程式 $g(t) = a$ がただ一つの実数解をもつ a の値は $a = 2$

解説 点 $(0, 2)$ から曲線 $C: y = f(x)$ に引いた接線の接点は、曲線の変曲点である。実際、 $g'(t) = -tf''(t)$ より、変曲点において、 $g(t)$ は極値をとる。したがって、曲線に引ける接線の本数は、曲線の変曲点における接線と曲線で区分される領域で分類できる。

補足 3次関数のグラフに引ける接線についても同様である¹.

¹http://kumamoto.s12.xrea.com/N/CHdai/CHdai_2017.pdf (p.12 を参照)

- 3 (1) 座標平面上に $P_0(1, 0)$, $P_n(0, 1)$, $P_{2n}(-1, 0)$, $P_{3n}(0, -1)$ をとると

$$P_0P_n = \sqrt{2}, \quad P_0P_{3n} = \sqrt{2}$$

$$\text{よって} \quad n \leq k \leq 3n$$

- (2) 各辺の長さがすべて $\sqrt{2}$ 以上であるとき, $4n$ 個の点 $P_0, P_1, \dots, P_{4n-1}$ の間が n 個以上離れているから, 0 以上の整数 i, j, k を用いて, 3 頂点を

$$P_i, P_{i+(n+j)}, P_{i+(n+j)+(n+k)} \quad \text{すなわち} \quad P_i, P_{n+i+j}, P_{2n+i+j+k}$$

とおき (これらの点は法 $4n$ について同一とみなす)

$$(2n + i + j + k) - i \leq 3n \quad \text{すなわち} \quad j + k \leq n$$

を満たせばよい. これを満たす非負整数 j, k の組合せは

$${}_3H_n = {}_{3+n-1}C_n = {}_{n+2}C_2 = \frac{1}{2}(n+2)(n+1)$$

また, $i = 0, 1, \dots, 4n-1$ で, 三角形の重複が 3 回であることから

$$g(n) = \frac{1}{2}(n+2)(n+1) \times 4n \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}n(n+1)(n+2)$$

補足 自然数 n に対して, $j+k+l=n$ を満たす非負整数 (j, k, l) の個数と $j+k \leq n$ を満たす非負整数 (j, k) の個数はともに重複組合せ ${}_3H_n$ である. 同様に, $j+k+l+m=n$ を満たす非負整数 (j, k, l, m) の個数と $j+k+l \leq n$ を満たす非負整数 (j, k, l) の個数はともに

$${}_4H_n = {}_{4+n-1}C_n = {}_{n+3}C_3 = \frac{1}{6}(n+3)(n+2)(n+1)$$

4 (1) n, k は自然数, $n \geq 2, 2 \leq k \leq 3n,$

$$g_n(k) = f\left(\frac{\pi}{3n}\right) + f\left(\frac{2\pi}{3n}\right) + \cdots + f\left(\frac{k\pi}{3n}\right) \text{ より}$$

$$(*) \quad g_n(k) - g_n(k-1) = f\left(\frac{k\pi}{3n}\right), \quad \frac{2\pi}{3n} \leq \frac{k\pi}{3n} \leq \pi$$

$f(x) = 4 \cos^2 x - 8 \cos x + 3 = (2 \cos x - 1)(2 \cos x - 3)$ より, $(*)$ は

$$g_n(k) - g_n(k-1) = \left(2 \cos \frac{k\pi}{3n} - 1\right) \left(2 \cos \frac{k\pi}{3n} - 3\right)$$

このとき, $2 \cos \frac{k\pi}{3n} - 3 < 0$ に注意して

$$g_n(1) > g_n(2) > \cdots > g_n(n-1) = g_n(n) < g_n(n+1) < \cdots < g_n(3n)$$

よって, $g_n(k)$ を最小にする k は $\mathbf{k = n - 1, n}$

(2) $G_n = g_n(n-1) = g_n(n)$ であるから

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{G_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g_n(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k\pi}{3n}\right) \\ &= \int_0^1 f\left(\frac{\pi}{3}x\right) dx = \frac{3}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} f(x) dx \\ &= \frac{3}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (4 \cos^2 x - 8 \cos x + 3) dx \\ &= \frac{3}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2 \cos 2x - 8 \cos x + 5) dx \\ &= \frac{3}{\pi} \left[\sin 2x - 8 \sin x + 5x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \mathbf{5 - \frac{21}{2\pi} \sqrt{3}} \end{aligned}$$

■

5 (1) $a_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2}$ を満たす数列 $\{a_n\}$ に対し, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ が

$$b_n = (1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)$$

$$c_n = 1 - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

で定義されたとき $b_n \geq c_n$ $\cdots (*)$

[1] $n = 1$ のとき $b_1 = 1 - a_1$, $c_1 = 1 - a_1$

よって, $n = 1$ のとき, $(*)$ が成立する.

[2] $n = k$ のとき, $(*)$ が成立する, すなわち

$$\prod_{j=1}^k (1 - a_j) \geq 1 - \sum_{j=1}^k a_j$$

であると仮定すると, $\{a_n\}$ の定義より $0 \leq a_{k+1} \leq \frac{1}{2}$ であるから

$$\begin{aligned} \prod_{j=1}^{k+1} (1 - a_j) &\geq (1 - a_{k+1}) \left(1 - \sum_{j=1}^k a_j \right) \\ &= 1 - \sum_{j=1}^{k+1} a_j + a_{k+1} \sum_{j=1}^k a_j \geq 1 - \sum_{j=1}^{k+1} a_j \end{aligned}$$

よって, $n = k + 1$ のときも, $(*)$ が成立する.

[1], [2] から, すべての自然数 n について, $(*)$ が成立する.

(2) $b_{n+1} = (1 - a_{n+1})b_n$, $c_{n+1} = c_n - a_{n+1}$ であるから

$$\begin{aligned} b_{n+1} - c_{n+1} &= (1 - a_{n+1})b_n - (c_n - a_{n+1}) \\ &= b_n - c_n + a_{n+1}(1 - b_n) \end{aligned}$$

$\frac{1}{2} \leq 1 - a_n \leq 1$ より, $b_n = \prod_{j=1}^n (1 - a_j) \leq 1$ ゆえに $1 - b_n \geq 0$

上式および $(*)$ より $b_{n+1} - c_{n+1} \geq b_n - c_n \geq 0$

したがって, $b_{n+1} = c_{n+1}$, すなわち, $b_{n+1} - c_{n+1} = 0$ のとき

$$b_n - c_n = 0 \quad \text{よって} \quad b_n = c_n$$

(3) (前半) $b_3 = \frac{1}{2}$ のとき, (1) の結果から $c_3 \leq \frac{1}{2}$

$$c_3 = 1 - (a_1 + a_2 + a_3) \leq \frac{1}{2} \quad \text{ゆえに} \quad a_1 + a_2 + a_3 \geq \frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{各項 } a_n \text{ が } a_n \geq 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2} \text{ より } a_1 + a_2 + a_3 \leq \frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より } a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\text{よって } c_3 = 1 - (a_1 + a_2 + a_3) = \frac{1}{2}$$

(後半) $b_3 = \frac{1}{2}$ のとき, (前半) の結果から, $\textcircled{3}$ および $c_3 = \frac{1}{2}$ が成立する.

$$\text{このとき } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2} \text{ および } \textcircled{3} \text{ から } a_n = 0 \quad (n \geq 4)$$

$b_3 = c_3$ であるから, (2) の結果から $b_2 = c_2$

$$(1 - a_1)(1 - a_2) = 1 - (a_1 + a_2) \quad \text{ゆえに} \quad a_1 a_2 = 0$$

したがって $a_1 = 0$ または $a_2 = 0$

$$b_3 = \frac{1}{2} \text{ および } \textcircled{3} \text{ より}$$

$$(1 - a_1)(1 - a_2)(1 - a_3) = \frac{1}{2}, \quad a_1 + a_2 + a_3 = \frac{1}{2} \quad (**)$$

(i) $a_1 = 0$ を (**) に代入すると

$$(1 - a_2)(1 - a_3) = \frac{1}{2}, \quad a_2 + a_3 = \frac{1}{2}$$

$$\text{すなわち} \quad a_2 + a_3 = \frac{1}{2}, \quad a_2 a_3 = 0$$

$$\text{これを解いて } (a_2, a_3) = \left(\frac{1}{2}, 0\right), \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

(ii) $a_2 = 0$ を (**) に代入すると

$$(1 - a_1)(1 - a_3) = \frac{1}{2}, \quad a_1 + a_3 = \frac{1}{2}$$

$$\text{これを解いて } (a_1, a_3) = \left(\frac{1}{2}, 0\right), \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

$$(i), (ii) \text{ より } (a_1, a_2, a_3) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), \left(0, \frac{1}{2}, 0\right), \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$$

よって, $\{a_n\}$ は全部で **3** 種類ある. ■