平成17年度 大阪大学 2次試験前期日程(数学問題)150分
理・工・基礎工学・医・歯・薬学部 数I・II・III・A・B・C

問題 1 2 3 4 5

1 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3$ とおく. 直線 $y = mx$ が曲線 $y = f(x)$ と相異なる3点で交わるような実数 m の範囲を求めよ.

2 正の整数 n に対して

$$S(n) = \sum_{p=1}^{2n} \frac{(-1)^{p-1}}{p}, \quad T(n) = \sum_{q=1}^n \frac{1}{n+q}$$

とおく. 等式 $S(n) = T(n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) が成り立つことを, 数学的帰納法を用いて示せ.

3 空間内の4点 A, B, C, D が

$$\begin{aligned} AB = 1, \quad AC = 2, \quad AD = 3 \\ \angle BAC = \angle CAD = 60^\circ, \quad \angle DAB = 90^\circ \end{aligned}$$

をみたしている. この4点から等距離にある点を E とする. 線分 AE の長さを求めよ.

4 θ を $0 \leq \theta < 2\pi$ をみたす実数とする. 時刻 t における座標が

$$\begin{cases} x = t \cos \theta \\ y = 1 - t^2 + t \sin \theta \end{cases}$$

で与えられるような動点 $P(x, y)$ を考える. t が実数全体を動くとき, 点 P が描く曲線を C とする. C が x 軸の $x \geq 0$ の部分と交わる点を Q とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき, Q の x 座標を求めよ.
- (2) θ が変化すると曲線 C も変化する. θ が $0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲を変化するとき, C が通過する範囲を xy 平面上に図示せよ.
- (3) θ が変化すると点 Q も変化する. Q の x 座標が最大となるような θ ($0 \leq \theta < 2\pi$) について $\tan \theta$ の値を求めよ.

5 n を正の整数, a を正の実数とする. 曲線 $y = x^n$ と曲線 $y = a \log x$ が, 点 P で共通の接線をもつとする. ただし, 対数は自然対数である. 点 P の x 座標を t とするとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) a, t をそれぞれ n を用いて表せ.
- (2) 曲線 $y = x^n$ と x 軸および直線 $x = t$ で囲まれる部分の面積を S_1 とする. また, 曲線 $y = a \log x$ と x 軸および直線 $x = t$ で囲まれる部分の面積を S_2 とする. このとき, $\frac{S_2}{S_1}$ を n を用いて表せ.
- (3) $x \geq 0$ のとき, 不等式

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$$

が成り立つことを, 次の (a), (b) に分けて示せ. ただし, e は自然対数の底とする.

- (a) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ が成り立つことを示せ.
- (b) $x \geq 0$ のとき, 不等式 $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1$ が成り立つことを示せ.
- (4) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_2}{S_1}$ を求めよ.

解答例

1 直線 $y = mx$ と曲線 $y = 2x^3 + x^2 - 3$ の2式から y を消去すると

$$mx = 2x^3 + x^2 - 3$$

$x = 0$ はこの方程式の解ではないから, $x \neq 0$ より

$$m = 2x^2 + x - \frac{3}{x} \quad \dots (*)$$

$g(x) = 2x^2 + x - \frac{3}{x}$ とおくと

$$\begin{aligned} g'(x) &= 4x + 1 + \frac{3}{x^2} \\ &= \frac{1}{x^2}(x+1)(4x^2 - 3x + 3) \end{aligned}$$

x	...	-1	...	(0)	...
$g'(x)$	-	0	+		+
$g(x)$	$\searrow$	4	$\nearrow$		$\nearrow$

$$\lim_{x \rightarrow -0} g(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow +0} g(x) = -\infty$$

方程式 (*) が, 異なる3つの実数解をもつ m の値の範囲を求めればよいから

$$m > 4$$

2 n を正の整数とする 2 式

$$S(n) = \sum_{p=1}^{2n} \frac{(-1)^{p-1}}{p}, \quad T(n) = \sum_{q=1}^n \frac{1}{n+q}$$

について, 等式 $S(n) = T(n)$ を (A) とする.

[1] $n = 1$ のとき

$$S(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad T(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

よって, $n = 1$ のとき, (A) が成立する.

[2] $n = k$ のとき, (A) が成立すると仮定すると

$$\begin{aligned} T(k+1) &= \sum_{q=1}^{k+1} \frac{1}{k+1+q} = \sum_{q=2}^{k+2} \frac{1}{k+q} \\ &= \sum_{q=1}^k \frac{1}{k+q} - \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k+2} \\ &= \sum_{q=1}^k \frac{1}{k+q} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} \\ &= T(k) + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} \\ &= S(k) + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} \\ &= \sum_{p=1}^{2k} \frac{(-1)^{p-1}}{p} + \frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} \\ &= \sum_{p=1}^{2(k+1)} \frac{(-1)^{p-1}}{p} = S(k+1) \end{aligned}$$

よって, $n = k+1$ のときも, (A) が成立する.

[1], [2] より, すべての自然数 n について, (A) は成立する.

補足
$$\begin{aligned} S(n) &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdots + \frac{1}{2n}\right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} = T(n) \end{aligned}$$

3 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, $\vec{d} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$, $\vec{x} = \overrightarrow{AE}$ とおくと

$$|\vec{b}| = |\vec{c}| = |\vec{d}| = 1, \quad \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{d} = 1 \cdot 1 \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \vec{b} \cdot \vec{d} = 1 \cdot 1 \cos 90^\circ = 0$$

E は 3 辺 AB, AC, AD の垂直二等分面上の点であるから

$$\vec{b} \cdot \left(\vec{x} - \frac{1}{2}\vec{b} \right) = 0, \quad \vec{c} \cdot (\vec{x} - \vec{c}) = 0, \quad \vec{d} \cdot \left(\vec{x} - \frac{3}{2}\vec{d} \right) = 0$$

$$\text{ゆえに} \quad \vec{b} \cdot \vec{x} = \frac{1}{2}, \quad \vec{c} \cdot \vec{x} = 1, \quad \vec{d} \cdot \vec{x} = \frac{3}{2}$$

$\vec{b} \perp \vec{d}$ より, $\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{b})\vec{b} - (\vec{c} \cdot \vec{d})\vec{d} = \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{d}$ は, $\vec{b}$, $\vec{d}$ と垂直である.

$$\begin{aligned} \left| \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{d} \right|^2 &= |\vec{c}|^2 + \frac{1}{4}|\vec{b}|^2 + \frac{1}{4}|\vec{d}|^2 - \vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{c} \cdot \vec{d} \\ &= 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\left| \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{d} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ であるから, $\vec{f} = \sqrt{2} \left(\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{d} \right)$ とおくと,

$\vec{b}$, $\vec{d}$, $\vec{f}$ は, 互いに垂直な単位ベクトルである.

$$\vec{f} \cdot \vec{x} = \sqrt{2} \left(\vec{c} \cdot \vec{x} - \frac{1}{2}\vec{b} \cdot \vec{x} - \frac{1}{2}\vec{d} \cdot \vec{x} \right) = \sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \right) = 0$$

$\vec{x} = (\vec{x} \cdot \vec{b})\vec{b} + (\vec{x} \cdot \vec{d})\vec{d} + (\vec{x} \cdot \vec{f})\vec{f} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{3}{2}\vec{d}$ であるから

$$\begin{aligned} AE = |\vec{x}| &= \frac{1}{2}|\vec{b} + 3\vec{d}| = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{b}|^2 + 6\vec{b} \cdot \vec{d} + 9|\vec{d}|^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{1 + 6 \cdot 0 + 9} = \frac{\sqrt{10}}{2} \end{aligned}$$

■

4 (1)
$$(*) \begin{cases} x = t \cos \theta \\ y = 1 - t^2 + t \sin \theta \end{cases}$$

(*) に $\theta = \frac{\pi}{4}$ を代入すると $x = \frac{t}{\sqrt{2}}$, $y = 1 - t^2 + \frac{t}{\sqrt{2}}$

上の 2 式から t を消去すると

$$y = -2x^2 + x + 1 \quad \text{ゆえに} \quad y = -(x-1)(2x+1)$$

求める点 Q の座標について, $y = 0$, $x \geq 0$ であるから $x = 1$

(2) (i) $\theta \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ のとき, (*) の第1式から $t = \frac{x}{\cos \theta}$

これを (*) の第2式に代入すると $y = -\frac{x^2}{\cos^2 \theta} + x \tan \theta + 1$

$$y = -x^2(1 + \tan^2 \theta) + x \tan \theta + 1$$

上式を $\tan \theta$ について整理すると

$$x^2 \tan^2 \theta - x \tan \theta + x^2 + y - 1 = 0 \quad (**)$$

これを $\tan \theta$ に関する方程式とみると, その解は実数解をもつ.
 $x \neq 0$ のとき, 係数について

$$(-x)^2 - 4x^2(x^2 + y - 1) \geq 0 \quad \text{ゆえに} \quad y \leq -x^2 + \frac{5}{4} \quad \dots \textcircled{1}$$

$x = 0$ を (**) に代入すると $y = 1$

(ii) $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ のとき, (*) より

$$x = 0, \quad y = -t^2 \pm t + 1 = -\left(t \mp \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \quad (\text{複号同順})$$

(i), (ii) から

$x \neq 0$ のとき $y \leq -x^2 + \frac{5}{4}$

$x = 0$ のとき $y \leq \frac{5}{4}$

よって $y \leq -x^2 + \frac{5}{4}$

したがって, 求める領域は, 右の図の斜線部分で境界線を含む.

(3) (2) の結果から, Q の x 座標が最大になるとき, $x = \frac{\sqrt{5}}{2}, y = 0$ である.

これを (**) に代入すると

$$\frac{5}{4} \tan^2 \theta - \frac{\sqrt{5}}{2} \tan \theta + \frac{1}{4} = 0 \quad \text{ゆえに} \quad (\sqrt{5} \tan \theta - 1)^2 = 0$$

よって $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ■

5 (1) $y = x^n$ より $y' = nx^{n-1}$

$$y = a \log x \text{ より } y' = \frac{a}{x}$$

これらの2曲線が点Pで共通の接線をもつとき (Pのx座標はt)

$$(*) \quad t^n = a \log t, \quad nt^{n-1} = \frac{a}{t}$$

$$(*) \text{ の第2式から } t^n = \frac{a}{n} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{ を } (*) \text{ の第1式に代入すると } \frac{a}{n} = a \log t \quad a > 0 \text{ より } t = e^{\frac{1}{n}} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{ を } \textcircled{1} \text{ に代入して } e = \frac{a}{n} \text{ よって } a = ne, \quad t = e^{\frac{1}{n}}$$

(2) S_1, S_2 は, 上の図から

$$S_1 = \int_0^t x^n dx = \frac{1}{n+1} \left[x^{n+1} \right]_0^t = \frac{t^{n+1}}{n+1},$$

$$S_2 = \int_1^t a \log x dx = a \left[x \log x - x \right]_1^t = a(t \log t - t + 1)$$

したがって

$$\begin{aligned} \frac{S_2}{S_1} &= \frac{n+1}{t^{n+1}} \cdot a(t \log t - t + 1) = \frac{(n+1)a}{t^n} \left(\log t - 1 + \frac{1}{t} \right) \\ &= \frac{(n+1)ne}{\left(e^{\frac{1}{n}}\right)^n} \left(\frac{1}{n} - 1 + e^{-\frac{1}{n}} \right) = n(n+1) \left(e^{-\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} - 1 \right) \end{aligned}$$

(3) (a) $0 \leq t \leq x$ において, $1 - e^{-t} \geq 0$ であるから

$$\int_0^x (1 - e^{-t}) dt = \left[t + e^{-t} \right]_0^x = e^{-x} + x - 1 \geq 0$$

これから, $0 \leq t \leq x$ において, $e^{-t} + t - 1 \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} \int_0^x (e^{-t} + t - 1) dt &= \left[-e^{-t} + \frac{t^2}{2} - t \right]_0^x \\ &= -e^{-x} + \frac{x^2}{2} - x + 1 \geq 0 \quad (**) \end{aligned}$$

よって, $x \geq 0$ のとき, $e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$

(b) (**) より, $0 \leq t \leq x$ において, $-e^{-t} + \frac{t^2}{2} - t + 1 \geq 0$ であるから

$$\begin{aligned} \int_0^x (-e^{-t} + \frac{t^2}{2} - t + 1) dt &= \left[e^{-t} + \frac{t^3}{6} - \frac{t^2}{2} + t \right]_0^x \\ &= e^{-x} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + x - 1 \geq 0 \end{aligned}$$

よって, $x \geq 0$ のとき, $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1$

(4) (a), (b) の結果から, $x \geq 0$ のとき

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$$

$x = \frac{1}{n}$ を上式に代入すると

$$\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} \leq e^{-\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} - 1 \leq \frac{1}{2n^2}$$

上式の辺々に $n(n+1)$ を掛けることにより, (2) の結果は

$$\frac{n+1}{2n} - \frac{n+1}{6n^2} \leq \frac{S_2}{S_1} \leq \frac{n+1}{2n}$$

このとき

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} - \frac{n+1}{6n^2} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3n} - \frac{1}{6n^2} \right) = \frac{1}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

よって, はさみうちの原理により $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_2}{S_1} = \frac{1}{2}$ ■