平成15年度 東北大学2次試験前期日程(数学問題)100分
文系(文, 教育, 法, 経済, 医(保健[看護]))

問題 1 2 3 4

1 実数 a に対して, 集合 A, B を

$$A = \{x \mid x^2 + (1 - a^2)x + a^3 - 2a^2 + a \leq 0, x \text{ は実数}\}$$

$$B = \{x \mid x^2 + (2a - 7)x + a^2 - 7a + 10 < 0, x \text{ は実数}\}$$

と定める. 共通部分 $A \cap B$ が空集合でないための a の範囲を求めよ.

2 三角形 ABC において,

$$AB = 1, \quad AC = 2, \quad \angle A = 60^\circ$$

とする. 正の数 m, n に対し, 辺 BC, CA, AB を $m : n$ の比に内分する点を順に D, E, F とする.

- (1) $\overrightarrow{DE}$ と $\overrightarrow{EF}$ が垂直であるときの比 $m : n$ を求めよ.
- (2) どのような正の整数 m, n に対しても, $\overrightarrow{AD}$ と $\overrightarrow{EF}$ は垂直ではないことを示せ.

3 ある人がバス停 A で A 発 B 行きのバスに乗り, バス停 B で B 発 C 行きのバスに乗りかえてバス停 C へ向かうものとする. バスの発車時刻, バス停での待ち時間, バスの乗車時間は次の5つの条件を満たすものとする.

1. A 発 B 行きおよび B 発 C 行きのバスは同時刻に3分おきで発車している.
2. バス停 A での待ち時間は0分または1分または2分で, それぞれの起こる確率は $\frac{1}{3}$ である.
3. バス停 B に到着後, 最初に発車する C 行きのバスに乗りかえる.
4. A 発 B 行きのバスの乗車時間は8分または10分で, それぞれの起こる確率は $\frac{1}{2}$ である.
5. B 発 C 行きのバスの乗車時間は6分または7分で, それぞれの起こる確率は $\frac{1}{2}$ である.

ただし, 条件2, 4, 5において, 待ち時間, 乗車時間の起こり方は独立であるとする. この人がバス停 A に到着後バス停 C へ到着するまでにかかる時間が n 分である確率 $P(n)$ を求めよ.

4 2つの関数を

$$t = \cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta$$

$$y = -4 \cos 3\theta + \cos 2\theta - \sqrt{3} \sin 2\theta + 2 \cos \theta + 2\sqrt{3} \sin \theta$$

とする.

- (1) $\cos 3\theta$ を t の関数で表せ.
- (2) y を t の関数で表せ.
- (3) $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき, y の最大値, 最小値とそのときの θ の値を求めよ.

解答例

1 集合 $A = \{x \mid x^2 + (1 - a^2)x + a^3 - 2a^2 + a \leq 0, x \text{ は実数}\}$ について

$$\begin{aligned} x^2 + (1 - a^2)x + (a - a^2)(1 - a) &\leq 0 \\ (x + 1 - a)(x + a - a^2) &\leq 0 \end{aligned}$$

ここで, $(a^2 - a) - (a - 1) = (a - 1)^2 \geq 0$ であるから

$$A = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a^2 - a, x \text{ は実数}\}$$

集合 $B = \{x \mid x^2 + (2a - 7)x + a^2 - 7a + 10 < 0, x \text{ は実数}\}$ について

$$\begin{aligned} x^2 + (2a - 7)x + (a - 2)(a - 5) &< 0 \\ (x + a - 2)(x + a - 5) &< 0 \\ B = \{x \mid 2 - a < x < 5 - a, x \text{ は実数}\} \end{aligned}$$

$A \cap B = \phi$ となるのは, 次の場合である

$$5 - a \leq a - 1 \quad \text{または} \quad a^2 - a \leq 2 - a$$

すなわち $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$ または $3 \leq a$

よって, $A \cap B \neq \phi$ となる a の範囲は

$$a < -\sqrt{2}, \quad \sqrt{2} < a < 3$$

2 (1) $\vec{c} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{a} = \overrightarrow{BA}$ とおくと, $\vec{c} \cdot \vec{a} = 0$, $|\vec{c}| = \sqrt{3}$, $|\vec{a}| = 1$

m, n は正の整数であるから, $t = \frac{m}{m+n}$ とおくと $0 < t < 1$

条件から $\overrightarrow{BD} = t\vec{c}$, $\overrightarrow{BE} = (1-t)\vec{c} + t\vec{a}$, $\overrightarrow{BF} = (1-t)\vec{a}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DE} &= \overrightarrow{BE} - \overrightarrow{BD} = (1-t)\vec{c} + t\vec{a} - t\vec{c} \\ &= (1-2t)\vec{c} + t\vec{a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{BF} - \overrightarrow{BE} = (1-t)\vec{a} - \{(1-t)\vec{c} + t\vec{a}\} \\ &= (t-1)\vec{c} + (1-2t)\vec{a} \quad \dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

条件より, $\overrightarrow{DE} \perp \overrightarrow{EF}$ であるから

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{EF} &= \{(1-2t)\vec{c} + t\vec{a}\} \cdot \{(t-1)\vec{c} + (1-2t)\vec{a}\} \\ &= (1-2t)(t-1)|\vec{c}|^2 + t(1-2t)|\vec{a}|^2 \\ &= 3(1-2t)(t-1) + t(1-2t) = (1-2t)(4t-3) = 0\end{aligned}$$

$0 < t < 1$ に注意して $t = \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$

$t = \frac{m}{m+n}$ より $t = \frac{1}{2}$ のとき $m : n = 1 : 1$

$t = \frac{3}{4}$ のとき $m : n = 3 : 1$

(2) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} = t\vec{c} - \vec{a}$, $\textcircled{1}$ より $\overrightarrow{EF} = (t-1)\vec{c} + (1-2t)\vec{a}$
 $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{EF}$ とすると

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EF} &= (t\vec{c} - \vec{a}) \cdot \{(t-1)\vec{c} + (1-2t)\vec{a}\} \\ &= t(t-1)|\vec{c}|^2 + (2t-1)|\vec{a}|^2 \\ &= 3t(t-1) + (2t-1) = 3t^2 - t - 1 = 0\end{aligned}$$

$0 < t < 1$ に注意してこれを解くと $t = \frac{1 + \sqrt{13}}{6}$

t (m, n は正の整数) が有理数であることに反し, 題意を満たす. ■

- 3 条件1により, AB間をそれぞれ8分, 10分かかるバスに乗ると, バス停Bでは1分, 2分待つことになる. 所要時間は次のようになる.

Aでの待ち時間	AB間+Bでの待ち時間	BC間	所要時間
0	8 + 1	6	15
		7	16
	10 + 2	6	18
		7	19
1	8 + 1	6	16
		7	17
	10 + 2	6	19
		7	20
2	8 + 1	6	17
		7	18
	10 + 2	6	20
		7	21

それぞれの所要時間は同様に確からしいので

$$n = 15, 21 \text{ のとき} \quad P(n) = \frac{1}{12}$$

$$n = 16, 17, 18, 19, 20 \text{ のとき} \quad P(n) = \frac{1}{6}$$

$$\text{この以外の } n \text{ のとき} \quad P(n) = 0$$

$$\boxed{4} \quad (1) \quad t = \cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta = 2 \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right), \quad \cos 3\theta = -\cos 3 \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\alpha = \theta - \frac{\pi}{3} \text{ とおくと } \cos \alpha = \frac{t}{2}, \quad \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} \cos 3\theta &= -\cos 3\alpha = -4 \cos^3 \alpha + 3 \cos \alpha \\ &= -4 \left(\frac{t}{2} \right)^3 + 3 \cdot \frac{t}{2} = -\frac{1}{2} t^3 + \frac{3}{2} t \end{aligned}$$

$$(2) \quad \alpha = \theta - \frac{\pi}{3} \text{ より}$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta - \sqrt{3} \sin 2\theta &= -2 \left(\cos 2\theta \cos \frac{2\pi}{3} + \sin 2\theta \sin \frac{2\pi}{3} \right) \\ &= -2 \cos \left(2\theta - \frac{2\pi}{3} \right) = -2 \cos 2\alpha \\ &= -2(2 \cos^2 \alpha - 1) = -2 \left(\frac{t^2}{2} - 1 \right) \\ &= -t^2 + 2 \end{aligned}$$

$$y = -4 \cos 3\theta + (\cos 2\theta - \sqrt{3} \sin 2\theta) + 2(\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta) \text{ より}$$

$$\begin{aligned} y &= -4 \left(-\frac{1}{2} t^3 + \frac{3}{2} t \right) + (-t^2 + 2) + 2t \\ &= \mathbf{2t^3 - t^2 - 4t + 2} \end{aligned}$$

$$\text{別解 } \alpha = \theta - \frac{\pi}{3} \text{ より, } \theta = \alpha + \frac{\pi}{3}, \quad t = 2 \cos \alpha \text{ より}$$

$$\begin{aligned} y &= -4 \cos 3\theta + \cos 2\theta - \sqrt{3} \sin 2\theta + 2 \cos \theta + 2\sqrt{3} \sin \theta \\ &= -4 \cos 3 \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) + \cos 2 \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) - \sqrt{3} \sin 2 \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \\ &\quad + 2 \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) + 2\sqrt{3} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \\ &= 4 \cos 3\alpha - 2 \cos 2\alpha + 4 \cos \alpha \\ &= 4(4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha) - 2(2 \cos^2 \alpha - 1) + 4 \cos \alpha \\ &= 16 \cos^3 \alpha - 4 \cos^2 \alpha - 8 \cos \alpha + 2 \\ &= 16 \left(\frac{t}{2} \right)^3 - 4 \left(\frac{t}{2} \right)^2 - 8 \cdot \frac{t}{2} + 2 \\ &= \mathbf{2t^3 - t^2 - 4t + 2} \end{aligned}$$

(3) $0 \leq \theta \leq \pi$, $t = 2 \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$, $f(t) = 2t^3 - t^2 - 4t + 2$ とおく

$$-1 \leq t \leq 2, \quad f'(t) = 6t^2 - 2t - 4 = 2(t-1)(3t+2)$$

t	-1	...	$-\frac{2}{3}$	...	1	...	2
$f'(t)$		+	0	-	0	+	
$f(t)$	3	$\nearrow$	$\frac{98}{27}$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	6

よって $t = 2$ すなわち $\theta = \frac{\pi}{3}$ のとき 最大値 6

$t = 1$ すなわち $\theta = 0, \frac{2\pi}{3}$ のとき 最小値 -1