平成14年度 東北大学2次試験前期日程(数学問題)150分
理系(理, 医(医・保健(放射線・検査)), 歯, 薬, 工, 農)

- 理・工学部は, [1] [2] [3] [4] [5] [6] 数I・II・III・A・B・C (150分)
- 医[医, 保健(放射線技術・検査技術)学科]・歯・薬・農学部は, [1] [2] [3] [4] 数I・II・III・A・B・C (100分)

[1] a, b は実数であり, 方程式

$$x^4 + (a+2)x^3 - (2a+2)x^2 + (b+1)x + a^3 = 0$$

が解 $x = 1 + i$ をもつとする. ただし, $i = \sqrt{-1}$ とする. このとき, a, b を求めよ. また, このときの方程式の他の解も求めよ.

[2] xy 平面上に, 媒介変数 t により表示された曲線

$$C: x = e^t - e^{-t}, \quad y = e^{3t} + e^{-3t}$$

がある.

- (1) x の関数 y の増減と凹凸を調べ, 曲線 C の概形を描け.
- (2) 曲線 C , x 軸, 2直線 $x = \pm 1$ で囲まれる部分の面積を求めよ.

[3]

上の図のような格子状の道路がある. 左下の A 地点から出発し, サイコロを繰り返し振り, 次の規則にしたがって進むものとする. 1の目が出たら右に2区画, 2の目が出たら右に1区画, 3の目が出たら上に1区画進み, その他の場合はそのまま動かない. ただし, 右端で1または2の目が出たとき, あるいは上端で3の目が出たときは, 動かない. また, 右端の1区画手前で1の目が出たときは, 右端まで進んで止まる.

n を8以上の自然数とする. A 地点から出発し, サイコロを n 回振るとき, ちょうど6回目に, B 地点以外の地点から進んで B 地点に止まり, n 回目までに C 地点に到達する確率を求めよ. ただし, サイコロのどの目が出るのも, 同様に確からしいものとする.

4 四面体 ABCD は各辺の長さが 1 の正四面体とする.

- (1) $\vec{AP} = l\vec{AB} + m\vec{AC} + n\vec{AD}$ で与えられる点 P に対し $|\vec{BP}| = |\vec{CP}| = |\vec{DP}|$ が成り立つならば, $l = m = n$ であることを示せ. また, このときの $|\vec{BP}|$ を l を用いて表せ.
- (2) A, B, C, D のいずれとも異なる空間内の点 P と点 Q を, 四面体 PBCD と四面体 QABC がともに正四面体になるようにとるとき, $\cos \angle PBQ$ の値を求めよ.

5 $a > b > 0$ とし, xy 平面の楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ の第 1 象限の部分を E とする. ただし, 第 1 象限には x 軸と y 軸は含まれない. E 上の点 P における E の接線と法線が y 軸と交わる点の y 座標をそれぞれ h と k とし, $L = h - k$ とおく. 点 P が E 上を動くとき, L の最小値が存在するための a と b についての条件と, そのときの L の最小値を求めよ.

6 $f_1(x)$ は実数全体で定義された何回でも微分可能な関数とする. $f_2(x), f_3(x), \dots$ を次のように順次定義する. $n = 2, 3, \dots$ に対し

$$F_{n-1}(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt$$

とにおいて

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)F_{n-1}(t) dt$$

とする. このとき, 以下の問いに答えよ.

- (1) $n \geq 2$ のとき, すべての x に対して $f_n(x) \geq 0$ であることを示せ.
- (2) $n \geq 3$ のとき, すべての $x \geq 0$ に対して $f'_n(x) \geq 0$ であることを示せ.
- (3) $f'_4(1) = 0$ のとき, すべての $0 \leq x \leq 1$ に対して $f_1(x) = 0$ であることを示せ.

解答例

1 実数を係数とする方程式が $x = 1 + i$ を解にもつから

$$P(x) = x^4 + (a + 2)x^3 - (2a + 2)x^2 + (b + 1)x + a^3$$

とおくと、 $P(x)$ は

$$\{x - (1 + i)\}\{x - (1 - i)\} \quad \text{すなわち} \quad x^2 - 2x + 2$$

を因数にもつ。

$$P(x) = (x^2 - 2x + 2)\{x^2 + (a + 4)x + 4\} + (b - 2a + 1)x + a^3 - 8$$

したがって $b - 2a + 1 = 0$, $a^3 - 8 = 0$ これを解いて $a = 2$, $b = 3$

$P(x) = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 6x + 4)$ より、 $P(x) = 0$ を解くと

$$x = 1 \pm i, \quad -3 \pm \sqrt{5}$$

よって、求める他の解は $1 - i, \quad -3 \pm \sqrt{5}$ ■

2 (1) $C: x = e^t - e^{-t}$, $y = e^{3t} + e^{-3t}$ より

$$\begin{aligned} y &= (e^{2t} - 1 + e^{-2t})(e^t + e^{-t}) \\ &= \{(e^t - e^{-t})^2 + 1\}\sqrt{(e^t - e^{-t})^2 + 4} \\ &= (x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 4} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} y' &= 2x\sqrt{x^2 + 4} + (x^2 + 1) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{3(x^3 + 3x)}{\sqrt{x^2 + 4}} \\ \frac{y''}{3} &= \frac{(3x^2 + 3)\sqrt{x^2 + 4} - (x^3 + 3x) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}}{x^2 + 4} \\ &= \frac{(3x^2 + 3)(x^2 + 4) - (x^3 + 3x)x}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2x^4 + 12x^2 + 12}{(x^2 + 4)^{\frac{3}{2}}} > 0 \end{aligned}$$

x の関数 y の増減および凹凸は下のとおり。

また、曲線 C の概形は右の図のとおり。

x	...	0	...
y'	-	0	+
y''	+	+	+
y	↘	2	↗

別解 $f(t) = e^t - e^{-t}$, $g(t) = e^{3t} + e^{-3t}$ とおくと¹

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{g'(t)}{f'(t)} = \frac{3(e^{3t} - e^{-3t})}{e^t + e^{-t}} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{g''(t)f'(t) - g'(t)f''(t)}{g'(t)^3} \\ &= \frac{9(e^{3t} + e^{-3t})(e^t + e^{-t}) - 3(e^{3t} - e^{-3t})(e^t - e^{-t})}{(e^t + e^{-t})^3} \\ &= \frac{6(e^{4t} + e^{-4t}) + 12(e^{2t} + e^{-2t})}{(e^t + e^{-t})^3} > 0\end{aligned}$$

$$t > 0, \text{ すなわち, } x > 0 \text{ のとき } \frac{dy}{dx} > 0$$

$$t < 0, \text{ すなわち, } x < 0 \text{ のとき } \frac{dy}{dx} < 0$$

$x < 0$ で単調減少, $x > 0$ で単調増加. C は下に凸.

(2) $x^3\sqrt{x^2+4}$, $x\sqrt{x^2+4}$ をそれぞれ微分すると

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^3\sqrt{x^2+4}) &= 3x^2\sqrt{x^2+4} + \frac{x^4}{\sqrt{x^2+4}} \\ &= (4x^2 - 4)\sqrt{x^2+4} + \frac{16}{\sqrt{x^2+4}}\end{aligned}\tag{A}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x\sqrt{x^2+4}) &= \sqrt{x^2+4} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+4}} \\ &= 2\sqrt{x^2+4} - \frac{4}{\sqrt{x^2+4}}\end{aligned}\tag{B}$$

(A) $\times \frac{1}{4}$ + (B) より

$$\frac{d}{dx} \left\{ \left(\frac{x^3}{4} + x \right) \sqrt{x^2+4} \right\} = (x^2+1)\sqrt{x^2+4}$$

求める面積を S とすると

$$\begin{aligned}S &= \int_{-1}^1 (x^2+1)\sqrt{x^2+4} dx = 2 \int_0^1 (x^2+1)\sqrt{x^2+4} dx \\ &= 2 \left[\left(\frac{x^3}{4} + x \right) \sqrt{x^2+4} \right]_0^1 = \frac{5\sqrt{5}}{2}\end{aligned}$$

¹<http://kumamoto.s12.xrea.com/kyusuu/kyukou/kyukou-2017.pdf> (p.5 を参照)

別解 $e^\alpha - e^{-\alpha} = 1$ のとき

$$e^\alpha + e^{-\alpha} = \sqrt{(e^\alpha - e^{-\alpha})^2 + 4} = \sqrt{5}$$

求める面積 S は

$$\begin{aligned} \frac{S}{2} &= \int_0^1 y \, dx = \int_0^\alpha y \frac{dx}{dt} \, dt \\ &= \int_0^\alpha (e^{3t} + e^{-3t})(e^t + e^{-t}) \, dt \\ &= \int_0^\alpha (e^{4t} + e^{-4t} + e^{2t} + e^{-2t}) \, dt \\ &= \left[\frac{1}{4}(e^{4t} - e^{-4t}) + \frac{1}{2}(e^{2t} - e^{-2t}) \right]_0^\alpha \\ &= \frac{1}{4}(e^{4\alpha} - e^{-4\alpha}) + \frac{1}{2}(e^{2\alpha} - e^{-2\alpha}) \\ &= \frac{1}{4}(e^{2\alpha} - e^{-2\alpha})(e^{2\alpha} + e^{-2\alpha} + 2) \\ &= \frac{1}{4}(e^\alpha - e^{-\alpha})(e^\alpha + e^{-\alpha})^3 \\ &= \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot (\sqrt{5})^3 = \frac{5\sqrt{5}}{4} \end{aligned}$$

よって $S = \frac{5\sqrt{5}}{2}$

- 3 ちょうど6回目でB地点に進むとき、5回終了時点でD、E、Fのいずれかの地点にある。

- (i) 5回目終了時点で地点Dにあるとき、3が2回、不動が3回の確率であるから

$$\frac{5!}{2!3!} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{10}{288}$$

- (ii) 5回目終了時点で地点Eにあるとき、2が1回、3が2回、不動が2回の確率であるから

$$\frac{5!}{1!2!2!} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{30}{864}$$

- (iii) 5回目終了時点で地点Fにあるとき、1が1回、3が1回、不動が3回の場合と2が2回、3が1回、不動が2回の場合の確率であるから

$$\frac{5!}{1!1!3!} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{5!}{2!1!2!} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{20}{288} + \frac{30}{864}$$

- (i)~(iii)より、ちょうど6回目で地点Bにある確率は

$$\left(\frac{10}{288} + \frac{30}{864} + \frac{20}{288} + \frac{30}{864}\right) \times \frac{1}{6} = \frac{25}{864}$$

$n-6$ 回の試行で1、2が1回も出ない事象を X 、3が1回も出ない事象を Y とすると、 $n-6$ 回の試行でB地点からC地点に進む確率は

$$\begin{aligned} P(\overline{X} \cap \overline{Y}) &= P(\overline{X \cup Y}) = 1 - P(X \cup Y) \\ &= 1 - P(X) - P(Y) + P(X \cap Y) \\ &= 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-6} - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-6} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6} \end{aligned}$$

求める確率は $\frac{25}{864} \left\{ 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-6} - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-6} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-6} \right\}$ ■

- 4 (1) 点 P から平面 BCD に垂線 PH を引くと、 $BP = CP = DP$ より

$$\triangle PBH \equiv \triangle PCH \equiv \triangle PDH$$

ゆえに $HB = HC = HD$ すなわち、H は $\triangle BCD$ の重心
点 A から平面 BCD に引いた垂線を AH' とすると、同様に

$$H'B = H'C = H'D$$

H と H' が一致するので、P は垂線 AH 上の点である。

$$\vec{AH} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}), \quad \vec{AP} = l\vec{AB} + m\vec{AC} + n\vec{AD}$$

について、 $\vec{AH} // \vec{AP}$ であるから $l = m = n$

したがって $\vec{AP} = l(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}) = 3l\vec{AH}$

$\vec{b} = \vec{AB}$, $\vec{c} = \vec{AC}$, $\vec{d} = \vec{AD}$ とおくと $\vec{AH} = \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$

$$\begin{aligned} \vec{BP} &= \vec{AP} - \vec{AB} = 3l\vec{AH} - \vec{AB} \\ &= l(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d}) - \vec{b} = (l-1)\vec{b} + l\vec{c} + l\vec{d} \end{aligned}$$

このとき $|\vec{b}| = |\vec{c}| = |\vec{d}| = 1$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{d} = \vec{d} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 1 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} |\vec{BP}|^2 &= (l-1)^2|\vec{b}|^2 + l^2|\vec{c}|^2 + l^2|\vec{d}|^2 \\ &\quad + 2(l-1)l\vec{b} \cdot \vec{c} + 2l^2\vec{c} \cdot \vec{d} + 2l(l-1)\vec{d} \cdot \vec{b} \\ &= (l-1)^2 + l^2 + l^2 + (l-1)l + l^2 + l(l-1) \\ &= 6l^2 - 4l + 1 \end{aligned}$$

よって $|\vec{BP}| = \sqrt{6l^2 - 4l + 1}$

- (2) P は平面 BCD に関して A と対称、Q は平面 ABC に関して D と対称であるから、 $\triangle ABC$ の重心を G とすると

$$\begin{aligned} \vec{AP} &= 2\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d}) \\ \vec{AQ} &= 2\vec{AG} - \vec{AD} = 2 \cdot \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c}) - \vec{d} = \frac{1}{3}(2\vec{b} + 2\vec{c} - 3\vec{d}) \\ \vec{PQ} &= \vec{AQ} - \vec{AP} = -\frac{5}{3}\vec{d} \end{aligned}$$

$PB = BQ = 1$, $PQ = \frac{5}{3}$ であるから、余弦定理により

$$\cos \angle PBQ = \frac{PB^2 + BQ^2 - PQ^2}{2PB \cdot BQ} = \frac{1 + 1 - \frac{25}{9}}{2} = -\frac{7}{18}$$

5 $a > b > 0$, $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($x > 0, y > 0$)

E 上の点 P を $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ とすると $(0 < \theta < \frac{\pi}{2})$

E 上の点 P における接線は

$$\frac{a \cos \theta}{a^2} x + \frac{b \sin \theta}{b^2} y = 1 \quad \text{ゆえに} \quad \frac{\cos \theta}{a} x + \frac{\sin \theta}{b} y = 1 \quad (1)$$

E 上の点 P における法線は, (1) と垂直であるから

$$\frac{\sin \theta}{b} (x - a \cos \theta) - \frac{\cos \theta}{a} (y - b \sin \theta) = 0 \quad (2)$$

h, k は (1), (2) にそれぞれ $x = 0$ を代入したときの y であるから

$$h = \frac{b}{\sin \theta}, \quad k = \frac{b^2 - a^2}{b} \sin \theta$$

$$L = h - k \text{ より } L = \frac{b}{\sin \theta} + \frac{a^2 - b^2}{b} \sin \theta$$

L が最小値をとるとき, 相加平均・相乗平均の大小関係により

$$L \geq 2\sqrt{\frac{b}{\sin \theta} \cdot \frac{a^2 - b^2}{b} \sin \theta} = 2\sqrt{a^2 - b^2}$$

上式において等号が成立するとき

$$\frac{b}{\sin \theta} = \frac{a^2 - b^2}{b} \sin \theta \quad \text{ゆえに} \quad \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 - b^2}} < 1 \quad \text{すなわち} \quad \sqrt{2}b < a$$

よって $\sqrt{2}b < a$ を満たすとき 最小値 $2\sqrt{a^2 - b^2}$ をとる

6 (1) (*) $F_{n-1}(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt$ より (**) $F'_{n-1}(x) = f_{n-1}(x)$

したがって, $F_{n-1}(0) = 0$ に注意して

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \int_0^x f_{n-1}(t)F_{n-1}(t) dt = \int_0^x F'_{n-1}(t)F_{n-1}(t) dt \\ &= \left[\frac{1}{2}F_{n-1}(t)^2 \right]_0^x = \frac{1}{2}F_{n-1}(x)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

(2) (1) の結果を (*), (**) に適用すると

$$n \geq 3 \text{ のとき } F_{n-1}(x) \geq 0, \quad F'_{n-1}(x) \geq 0 \quad (x \geq 0) \quad (\text{A})$$

このとき, (1) の結果を微分することにより

$$n \geq 3 \text{ のとき } f'_n(x) = F'_{n-1}(x)F_{n-1}(x) \geq 0 \quad (x \geq 0) \quad (\text{B})$$

(3) (1) の結果および (*) から $F_n(x) \geq 0$ ($n \geq 1$)

(A) から $F'_n(x) \geq 0$ ($n \geq 2$)

$f'_n(1) = 0$ のとき ($2 \leq n \leq 4$), (B) より

$$F'_{n-1}(1) = 0 \quad \text{または} \quad F_{n-1}(1) = 0$$

このとき

$$\begin{aligned} F_{n-1}(1) = 0 &\implies F_{n-1}(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \\ &\implies F'_{n-1}(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \\ &\implies f_{n-1}(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \\ &\implies f'_{n-1}(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \\ &\implies f'_{n-1}(1) = 0 \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} f'_4(1) = 0 &\implies f'_3(1) = 0 \\ &\implies f'_2(1) = 0 \\ &\implies f_1(x) = 0 \quad (0 \leq x \leq 1) \end{aligned}$$