平成17年度 東北大学2次試験前期日程(数学問題)150分
理系(理, 医(医・保健(放射線・検査)), 歯, 薬, 工, 農)

- 理・工学部は, 1 2 3 4 5 6 数I・II・III・A・B・C (150分)
- 医[医, 保健(放射線技術・検査技術)学科]・歯・薬・農学部は, 1 2 3 4 数I・II・III・A・B・C (100分)

1 $0 < t < \frac{1}{2}$ とし, 平面上のベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ と単位ベクトル $\vec{e}$ が

(i) $(1-t)\vec{a} + t\vec{b} = \vec{e}$

(ii) $(1-t)(\vec{a} + \vec{e}) = t(\vec{b} + \vec{e})$

を満たすとする. さらに平面上のベクトル $\vec{x}$ があって, $\vec{x} - \vec{a}$ と $\vec{x} - \vec{b}$ が垂直で長さの比が $t : 1-t$ となるとする. このとき, 内積 $\vec{x} \cdot \vec{e}$ を t で表せ.

2 すべての内角が 180° より小さい四角形 ABCD がある. 辺の長さが $AB = BC = r$, $AD = 2r$ とする. さらに, 辺 CD 上の点 E があり, 3つの三角形 $\triangle ABC$, $\triangle ACE$, $\triangle ADE$ の面積はすべて等しいとする. $\alpha = \angle BAC$, $\beta = \angle CAD$ とおく.

(1) $\alpha = \beta$ を示せ.

(2) $\cos \angle DAB = \frac{3}{5}$ であるとするとき, $\sin \angle CAE$ の値を求めよ.

- 3** 1から n までの数字を1つずつ書いた n 枚のカードが箱に入っている. この箱から無作為にカードを1枚取り出して数字を記録し, 箱に戻すという操作を繰り返す. ただし, k 回目の操作で直前のカードと同じ数字か直前のカードよりも小さい数字のカードを取り出した場合に, k を得点として終了する.

- (1) $2 \leq k \leq n+1$ を満たす自然数 k について, 得点が k となる確率を求めよ.
 (2) 得点の期待値を n で表した式を $f(n)$ とするとき, $f(n)$ および極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ を求めよ.

- 4** a を負の実数とし, 放物線 $C_1: y = ax^2 + bx + c$ を考える. C_1 が曲線

$$C_2: y = \begin{cases} x^2 - x + \frac{3}{4} & (x > 0 \text{ のとき}) \\ x^2 + 2x + \frac{3}{4} & (x \leq 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

と2点で接するとき, C_1 と C_2 で囲まれた図形の面積を a で表せ.

- 5** a, b を $a^2 \neq b^2$ を満たす0でない実数とし, A_n を次の関係式で定まる2次の正方向行列とする.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & a^{-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_{n+1} \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix} A_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- (1) 行列 $C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ で

$$C \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

を満たすものを求めよ.

- (2) A_n を a, b, n で表せ.
 (3) $n \rightarrow \infty$ のとき A_n のすべての成分が収束するための条件を求めよ.

- 6** a を $0 < a < 1$ を満たす定数とし,

$$f(x) = \frac{\cos 2x - 2}{a \cos x + 1}$$

とする.

- (1) $f(x)$ が $0 \leq x \leq \pi$ で減少関数となる a の範囲を求めよ.
 (2) $f(x)$ の $0 \leq x \leq \pi$ における最大値は $f(0)$ であることを示せ.

解答例

$$\boxed{1} \quad 0 < t < \frac{1}{2}, \quad (\text{i}), (\text{ii}) \text{ より, } \vec{a} = \frac{t}{1-t}\vec{e}, \quad \vec{b} = \frac{1-t}{t}\vec{e} \quad \dots (*)$$

$$(1-t)^2\vec{a} = t^2\vec{b}, \quad \vec{a}\cdot\vec{b} = 1 \quad \dots (**)$$

$$|\vec{x} - \vec{a}| : |\vec{x} - \vec{b}| = t : 1-t \text{ より } (1-t)|\vec{x} - \vec{a}| = t|\vec{x} - \vec{b}|$$

$$(1-t)^2(|\vec{x}|^2 - 2\vec{a}\cdot\vec{x} + |\vec{a}|^2) = t^2(|\vec{x}|^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{x} + |\vec{b}|^2)$$

$$(*), (**) \text{ より } (1-t)^2|\vec{x}|^2 + t^2 = t^2|\vec{x}|^2 + (1-t)^2$$

$$(1-2t)|\vec{x}|^2 = 1-2t \quad \text{ゆえに } |\vec{x}| = 1 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$(\vec{x} - \vec{a})\cdot(\vec{x} - \vec{b}) = 0 \text{ より } |\vec{x}|^2 - (\vec{a} + \vec{b})\cdot\vec{x} + \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$$

(*), (**), および ① から

$$2 - \left(\frac{t}{1-t} + \frac{1-t}{t} \right) \vec{e}\cdot\vec{x} = 0 \quad \text{よって } \vec{x}\cdot\vec{e} = \frac{2t(1-t)}{2t^2 - 2t + 1}$$

■

- 2 (1) $\triangle ABC = \triangle ACE = \triangle ADE$ より $\triangle ACD = 2\triangle ABC$

$$\frac{1}{2}AC \cdot AD \sin \beta = 2 \cdot \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin \alpha$$

したがって $\frac{1}{2}AC \cdot 2r \sin \beta = 2 \cdot \frac{1}{2}r \cdot AC \sin \alpha$ ゆえに $\sin \alpha = \sin \beta$

$\alpha + \beta < 180^\circ$ であるから, $\beta \neq 180^\circ - \alpha$ に注意すると $\alpha = \beta$

- (2) $\triangle ACE = \triangle ADE$ より $CE = DE$

線分 AB の B の延長上に $AD' = AD = 2r$ となる点 D' をとると, (1) の結果より, $\triangle ACD' \equiv \triangle ACD$ であるから $\angle ACD = 90^\circ$

点 H を辺 AC の中点とすると, 中点連結定理により

$$BH // D'C, \quad BH = \frac{1}{2}D'C = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2} \cdot 2CE = CE$$

したがって $CE = BH = r \sin \alpha$, $AC = 2AH = 2r \cos \alpha$

$$\cos \angle DAB = \cos(\alpha + \beta) = \cos 2\alpha = \frac{3}{5} \text{ より } 2 \cos^2 \alpha - 1 = \frac{3}{5}$$

$$\text{これを解いて } \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \tan \alpha = \frac{1}{2}$$

$\theta = \angle CAE$ とすると

$$\tan \theta = \frac{CE}{AC} = \frac{r \sin \alpha}{2r \cos \alpha} = \frac{1}{2} \tan \alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$1 + \frac{1}{\tan^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} \text{ より}$$

$$1 + 4^2 = \frac{1}{\sin^2 \theta} \text{ ゆえに } \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{17}}$$

- 3** (1) i 回目に取り出したカードを x_i とする ($1 \leq i \leq n$). 得点が k であるとき

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{k-2} < x_{k-1} \geq x_k \quad (2 \leq k \leq n)$$

$j = x_{k-1}$ ($k-1 \leq j \leq n$) とおくと (j を固定して考える)

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_{k-2}$$

を満たす組は ${}_{j-1}C_{k-2}$ 通りあり, $j \geq x_k$ を満たす x_k は j 通りあるから, 求める確率 p_k は

$$p_k = \sum_{j=k-1}^n \frac{{}_{j-1}C_{k-2} \cdot j}{n^k} = \frac{k-1}{n^k} \sum_{j=k-1}^n j C_{k-1}$$

ここで, 非負整数 l, m について

$$\binom{l}{m} = \begin{cases} {}_lC_m & (l \geq m) \\ 0 & (l < m) \end{cases}$$

とすると, 次式が成立する.

$$\binom{l-1}{m-1} = \binom{l}{m} - \binom{l-1}{m}$$

したがって

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{k-1}{n^k} \sum_{j=k-1}^n \binom{j}{k-1} = \frac{k-1}{n^k} \sum_{j=k-1}^n \left\{ \binom{j+1}{k} - \binom{j}{k} \right\} \\ &= \frac{k-1}{n^k} \binom{n+1}{k} = \frac{(k-1)_{n+1} C_k}{n^k} \end{aligned}$$

上式は, $k = n+1$ のときも成立するから, 求める確率は

$$p_k = \frac{(k-1)_{n+1} C_k}{n^k} \quad (2 \leq k \leq n+1)$$

- (2) (1) の結果から期待値 $f(n)$ は

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{k=2}^{n+1} k p_k = \sum_{k=2}^{n+1} \frac{k(k-1)_{n+1} C_k}{n^k} = \frac{n+1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} \frac{{}_{n-1}C_{k-2}}{n^{k-2}} \\ &= \frac{n+1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} {}_{n-1}C_k \left(\frac{1}{n}\right)^k = \frac{n+1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \end{aligned}$$

よって $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ■

4 $C_1 : y = ax^2 + bx + c$

C_1 と $y = x^2 - x + \frac{3}{4}$ ($x > 0$) の2式から y を消去して整理すると

$$(1-a)x^2 - (b+1)x + \frac{3}{4} - c = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

C_1 と $y = x^2 + 2x + \frac{3}{4}$ ($x \leq 0$) の2式から y を消去して整理すると

$$(1-a)x^2 - (b-2)x + \frac{3}{4} - c = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② の2次方程式は, ともに重解をもつから, 係数について

$$(b+1)^2 - 4(1-a)\left(\frac{3}{4} - c\right) = 0,$$

$$(b-2)^2 - 4(1-a)\left(\frac{3}{4} - c\right) = 0$$

上の2式から $(b+1)^2 = (b-2)^2$ これを解いて $b = \frac{1}{2}$

したがって 方程式①の重解は $x = \frac{b+1}{2(1-a)} = \frac{3}{4(1-a)}$

方程式②の重解は $x = \frac{b-2}{2(1-a)} = -\frac{3}{4(1-a)}$

$$p = \frac{3}{4(1-a)} \text{ とおくと}$$

$$\begin{aligned} x^2 - x + \frac{3}{4} - (ax^2 + bx + c) &= (1-a)(x-p)^2 \\ x^2 + 2x + \frac{3}{4} - (ax^2 + bx + c) &= (1-a)(x+p)^2 \end{aligned}$$

求める面積を S とおくと

$$\begin{aligned} \frac{S}{1-a} &= \int_{-p}^0 (x+p)^2 dx + \int_0^p (x-p)^2 dx \\ &= \frac{1}{3} \left[(x+p)^3 \right]_{-p}^0 + \frac{1}{3} \left[(x-p)^3 \right]_0^p = \frac{2}{3} p^3 \end{aligned}$$

$$\text{よって } S = \frac{2}{3}(1-a)p^3 = \frac{2}{3}(1-a) \left\{ \frac{3}{4(1-a)} \right\}^3 = \frac{9}{32(1-a)^2} \quad \blacksquare$$

5 (1) $C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$ を

$$C \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{1}$$

に代入すると

$$\begin{pmatrix} ay + bz & ax + bu \\ au + bx & az + by \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

したがって

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + bu & ay + bz \\ au + bx & az + by \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ u & z \end{pmatrix}$$

$a^2 - b^2 \neq 0$ であるから

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x & y \\ u & z \end{pmatrix} &= \frac{1}{a^2 - b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{よって } C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & u \end{pmatrix} = \frac{1}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{とおくと } F^2 = E$$

与えられた漸化式から

$$aA_{n+1}F + bFA_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ から } a(A_{n+1} - C)F + bF(A_n - C) = O$$

$$a \neq 0 \text{ であるから } A_{n+1} - C = -\frac{b}{a}F(A_n - C)F$$

$$r = \frac{b}{a} \text{ とおくと } A_{n+1} - C = -r(A_n - C) \cdots (*)$$

$$A_1 - C = \begin{pmatrix} 0 & a^{-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_2 - C = -rF(A_1 - C)F$$

$$= -\frac{r}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -r \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{r}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ r & 0 \end{pmatrix}$$

(i) n が奇数のとき, (*) より

$$\begin{aligned} A_n - C &= (-r)^{n-1} F^{n-1}(A_1 - C)F^{n-1} \\ &= r^{n-1}(A_1 - C) \end{aligned}$$

$$A^n = \frac{1}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & 1-r^n \\ r^{n-1}-1 & 0 \end{pmatrix} \quad r = \frac{b}{a}$$

(ii) n が偶数のとき, (*) より

$$\begin{aligned} A_n - C &= (-r)^{n-2} F^{n-2}(A_2 - C)F^{n-2} \\ &= r^{n-2}(A_2 - C) \end{aligned}$$

$$A^n = \frac{1}{a-b} \begin{pmatrix} 0 & 1-r^{n-1} \\ r^n-1 & 0 \end{pmatrix} \quad r = \frac{b}{a}$$

$$(3) A_n \text{ が収束するのは } \left| \frac{b}{a} \right| < 1 \text{ すなわち } |b| < |a|$$

■

$$\boxed{6} \quad (1) \quad f(x) = \frac{\cos 2x - 2}{a \cos x + 1} = \frac{2 \cos^2 x - 3}{a \cos x + 1}$$

$$t = \cos x \quad (0 \leq x \leq \pi) \text{ とすると } \quad -1 \leq t \leq 1$$

$$g(t) = \frac{2t^2 - 3}{at + 1} \text{ とおくと, } f(x) = g(t) \text{ より}$$

$$f'(x) = -g'(t) \sin x$$

$f'(x) < 0$ のとき, $g'(t) > 0$ より, $-1 \leq t \leq 1$ において, $g(t)$ は増加関数

$$g'(t) = \frac{4t(at + 1) - (2t^2 - 3) \cdot a}{(at + 1)^2} = \frac{2at^2 + 4t + 3a}{(at + 1)^2}$$

$$2at^2 + 4t + 3a = 2a \left(t + \frac{1}{a} \right)^2 - \frac{2}{a} + 3a \text{ より } (0 < a < 1)$$

$g'(-1) \geq 0$ を満たせばよいから

$$5a - 4 \geq 0 \quad \text{よって} \quad \frac{4}{5} \leq a < 1$$

(2) (i) $\frac{4}{5} \leq a < 1$ のとき, $f(x)$ は減少関数であるから, 最大値は $f(0)$

(ii) $0 < a < \frac{4}{5}$ のとき, $f'(x) = 0$ の唯一の解を α とすると

x	0	...	α	...	π
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$		$\searrow$	極小	$\nearrow$	

$$f(0) - f(\pi) = \frac{-1}{1+a} - \frac{-1}{1-a} = \frac{2a}{(1+a)(1-a)} > 0$$

したがって 最大値は $f(0)$

(i), (ii) より, $0 \leq x \leq \pi$ における $f(x)$ の最大値は $f(0)$ ■