令和7年度 九州工業大学2次試験前期日程(数学問題)

工学部・情報工学部 令和7年2月25日

数I・II・III・A・B・C (120分)

問題 1 2 3 4

1 2つのさいころを同時に投げることを1回の試行とする。1回の試行につき、2つのさいころの出た目の和が奇数の場合は1点、偶数の場合は2点得られる。さらに、2つのさいころの出た目が同じ場合は、追加で1点得られるとする。次の問いに答えよ。

- (1) 5回の試行のあとの合計得点の最小値と最大値を求めよ。
- (2) 5回の試行のあとの合計得点が8である確率を求めよ。

さらに、最初の試行から数えて n 回の試行のあとの合計得点が奇数である確率を a_n とする ($n = 1, 2, 3, \dots$)。

- (3) a_1, a_2 をそれぞれ求めよ。
- (4) a_{n+1} を a_n を用いて表せ。
- (5) 数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。
- (6) 5回の試行のあとの合計得点が奇数であった。このとき、4回の試行のあとの合計得点が奇数である条件付き確率を求めよ。

2 座標平面上の原点 O を頂点とし、点 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ を焦点とし、直線 $x = -\frac{1}{4}$ を準線 l とする放物線を C とする。つまり、 C は F と l からの距離が等しい点 P の軌跡である。 C 上の2点 $Q(s, t), Q'(v, w)$ は、 $s > v, t > 0, w < 0$ を満たし、さらに直線 OQ と直線 OQ' は垂直であるとする。また、直線 QQ' を m とする。次の問いに答えよ。

- (1) 放物線 C の方程式を求めよ。
- (2) 直線 m の傾きを t を用いて表せ。
- (3) 直線 m は t の値によらず、定点 E を通る。この E の座標を求めよ。
- (4) 点 Q から y 軸に下ろした垂線を QR とし、直線 m と y 軸の交点を S とする。 t の値が変化するとき、 $\triangle QRS$ の面積 T の最小値を求めよ。

3 n が自然数のとき、関数 $y = x^n e^{-x}$ について、次の問いに答えよ。

- (1) $n = 1$ の場合の関数 $y = x e^{-x}$ の最大値を求めよ。
- (2) $n = 2$ の場合の関数 $y = x^2 e^{-x}$ の極値を求めよ。
- (3) $n \geq 3$ の場合の関数 $y = x^n e^{-x}$ のグラフの変曲点を求めよ。
- (4) (3) で求めた変曲点のうち、 y 座標の値が最大のもののはどれか。理由とともに答えよ。ただし、任意の実数 $t > 1$ に対して、 $\left(\frac{t+1}{t-1}\right)^t > e^2$ が成り立つことを用いてよい。
- (5) $I_n = \int_0^2 x^n e^{-x} dx$ とおくと、 I_{n+1} を I_n の式で表せ。

4 原点を O とする座標空間に 3 点 $P(b, a-b, 0)$, $Q(0, b, a-b)$, $R(b, 0, a-b)$ がある。ただし、 a と b は、 $a > b > 0$ を満たす実数とする。次の問いに答えよ。

- (1) 点 G は 2 点 P, R を通る直線上にあるものとする。ベクトル $\overrightarrow{OG}$ と $\overrightarrow{PR}$ が垂直であるとき、点 G の座標を、 a, b を用いて表せ。
- (2) ベクトル $\overrightarrow{QP}$ と $\overrightarrow{QR}$ のなす角が 90° 以上となるための条件を、 a, b を用いて表せ。
- (3) $\triangle PQR$ の面積を、 a, b を用いて表せ。
- (4) 次の条件を満たす a の最大値を求めよ。ただし、 $1.7 < \sqrt{3} < 1.8$ を用いてよい。

条件： a, b は自然数であり、 $a > b$ を満たすすべての b に対して $\triangle PQR$ の面積が 10 未満である。

解答例

- 1 (1) 5回の試行のすべて得点が3点であるとき、**最大値 15(点)**
5回の試行のすべて得点が1点であるとき、**最小値 5(点)**

- (2) 1回の試行で得点が1点, 2点, 3点となる確率は, $p = \frac{1}{6}$ とおくと, それぞれ

$$\frac{18}{36} = 3p, \quad \frac{12}{36} = 2p, \quad \frac{6}{36} = p$$

5回の試行の後の合計得点が8になる得点の組合せは

	1	2	3	4	5	6
1	3	1	2	1	2	1
2	1	3	1	2	1	2
3	2	1	3	1	2	1
4	1	2	1	3	1	2
5	2	1	2	1	3	1
6	1	2	1	2	1	3

$$\{1, 1, 2, 2, 2\}, \{1, 1, 1, 2, 3\}$$

したがって, 求める確率は

$$\begin{aligned} \frac{5!}{2!3!}(3p)^2(2p)^3 + \frac{5!}{3!1!1!}(3p)^3 \cdot 2p \cdot p &= 720p^5 + 1080p^5 \\ &= 1800p^5 = \frac{1800}{6^5} = \frac{25}{108} \end{aligned}$$

- (3) 1回の試行で得点が奇数となる確率は $3p + p = 4p = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

1回の試行で得点が偶数となる確率は $2p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

したがって $a_1 = \frac{2}{3}, \quad a_2 = \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$

- (4) (3)で示した試行の確率により

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}(1 - a_n) = -\frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}$$

よって $a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n + \frac{2}{3}$

- (5) (4)の結果から $a_{n+1} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}\left(a_n - \frac{1}{2}\right)$

$\left\{a_n - \frac{1}{2}\right\}$ は初項 $a_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$, 公比 $-\frac{1}{3}$ の等比数列であるから

$$a_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} \quad \text{よって} \quad a_n = \frac{1}{2} \left\{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n\right\}$$

- (6) 5回の試行のあとの合計得点が奇数である事象を A とし, 4回の試行のあとの合計得点が奇数である事象を B とすると

$$P(A) = a_5 = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^5 \right\} = \frac{122}{243}$$

$$P(A \cap B) = a_4 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^4 \right\} \times \frac{1}{3} = \frac{40}{243}$$

したがって, 求める条件付き確率は

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{40}{243} \bigg/ \frac{122}{243} = \frac{20}{61}$$

- 2 (1) 焦点 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$, 準線 $l: x = -\frac{1}{4}$ の放物線 C の方程式は

$$y^2 = 4 \cdot \frac{1}{4} x \quad \text{ゆえに} \quad y^2 = x$$

- (2) Q, Q' は C 上の点であるから $Q(t^2, t), Q'(w^2, w)$
 $\overrightarrow{OQ} \perp \overrightarrow{OQ'}$ であるから, $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{OQ'} = 0$ より ($w < 0 < t$)

$$t^2 w^2 + tw = 0 \quad \text{ゆえに} \quad w = -\frac{1}{t} \quad \dots \textcircled{1}$$

直線 m の傾きは

$$\frac{w - t}{w^2 - t^2} = \frac{1}{w + t} = \frac{1}{-\frac{1}{t} + t} = \frac{t}{t^2 - 1}$$

- (3) 直線 m は, 点 $Q(t^2, t)$ を通り, 傾き $\frac{t}{t^2 - 1}$ の直線であるから

$$y - t = \frac{t}{t^2 - 1}(x - t^2) \quad \text{ゆえに} \quad t(x - 1) + (1 - t^2)y = 0 \quad (*)$$

上の第2式は, $x - 1 = 0, y = 0$, すなわち, $x = 1, y = 0$ のとき, すべての t について成立する. よって, 求める点 E の座標は $(1, 0)$

$$(4) s = t^2, v = w^2, s > v \text{ より } t^2 > w^2$$

$$\textcircled{1} \text{ より } (t > 0) \quad t^2 > \frac{1}{t^2} \quad \text{ゆえに } t^4 > 1 \quad \text{すなわち } t > 1$$

点 S の y 座標は, (*) に $x = 0$ を代入して

$$-t + (1 - t^2)y = 0 \quad \text{ゆえに } y = \frac{t}{1 - t^2}$$

これと R の y 座標 t および Q の x 座標 t^2 より

$$T = \frac{1}{2} \left(t - \frac{t}{1 - t^2} \right) t^2 = \frac{t^5}{2(t^2 - 1)}$$

これを t で微分すると

$$T' = \frac{5t^4(t^2 - 1) - t^5 \cdot 2t}{2(t^2 - 1)^2} = \frac{t^4(3t^2 - 5)}{2(t^2 - 1)^2}$$

$t > 1$ における T の増減表は

t	(1)	...	$\sqrt{\frac{5}{3}}$	...
T'		-	0	+
T		$\searrow$	極小	$\nearrow$

よって $t = \sqrt{\frac{5}{3}}$ のとき, 最小値 $\frac{25}{12} \sqrt{\frac{5}{3}}$

3 (1) $y = xe^{-x}$ より $y' = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$

x	...	1	...
y'	+	0	-
y	↗	極大	↘

よって $x = 1$ のとき 最大値 $\frac{1}{e}$

(2) $y = x^2e^{-x}$ より $y' = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$

x	...	0	...	2	...
y'	-	0	+	0	-
y	↘	極小	↗	極大	↘

よって $x = 0$ のとき 極小値 0 , $x = 2$ のとき 極大値 $\frac{4}{e^2}$

(3) $y = x^n e^{-x}$ より ($n \geq 3$)

$$y' = nx^{n-1}e^{-x} - x^n e^{-x}$$

$$y'' = n(n-1)x^{n-2}e^{-x} - 2nx^{n-1}e^{-x} + x^n e^{-x}$$

$$= (x^2 - 2nx + n^2 - n)x^{n-2}e^{-x}$$

$$= (x - n + \sqrt{n})(x - n - \sqrt{n})x^{n-2}e^{-x}$$

n が偶数のとき	x	...	0	...	$n - \sqrt{n}$	...	$n + \sqrt{n}$	...
	y''	+	0	+	0	-	0	+
n が奇数のとき	x	...	0	...	$n - \sqrt{n}$	...	$n + \sqrt{n}$	...
	y''	-	0	+	0	-	0	+

変曲点は n が偶数のとき $(n \pm \sqrt{n}, (n \pm \sqrt{n})^n e^{-n \mp \sqrt{n}})$ (複号同順)

n が奇数のとき $(0, 0), (n \pm \sqrt{n}, (n \pm \sqrt{n})^n e^{-n \mp \sqrt{n}})$ (複号同順)

(4) (3) で求めた 2 つの変曲点の y 座標を

$$y_1 = (n - \sqrt{n})^n e^{-n + \sqrt{n}}, \quad y_2 = (n + \sqrt{n})^n e^{-n - \sqrt{n}}$$

とおくと

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{(n + \sqrt{n})^n e^{-n - \sqrt{n}}}{(n - \sqrt{n})^n e^{-n + \sqrt{n}}} = \left(\frac{\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n} - 1} \right)^n e^{-2\sqrt{n}} = \left\{ \left(\frac{\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n} - 1} \right)^{\sqrt{n}} e^{-2} \right\}^{\sqrt{n}}$$

$$\sqrt{n} > 1 \text{ より } \left(\frac{\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n} - 1} \right)^{\sqrt{n}} > e^2 \text{ ゆえに } \left(\frac{\sqrt{n} + 1}{\sqrt{n} - 1} \right)^{\sqrt{n}} e^{-2} > 1$$

$$y_2 > y_1 \text{ であるから } (n + \sqrt{n}, (n + \sqrt{n})^n e^{-n - \sqrt{n}})$$

$$(5) I_n = \int_0^2 x^n e^{-x} dx \text{ より}$$

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^2 x^{n+1} e^{-x} dx = - \int_0^2 x^{n+1} (e^{-x})' dx \\ &= - \left[x^{n+1} e^{-x} \right]_0^2 + (n+1) \int_0^2 x^n e^{-x} dx \\ &= -2^{n+1} e^{-2} + (n+1) I_n \end{aligned}$$

注意 $f'(\alpha) = 0$ であっても, $x = \alpha$ の前後で $f'(x)$ の符号が変わらないとき, $f(\alpha)$ は極値ではない. 同様に, $f''(\beta) = 0$ であって, $x = \beta$ の前後で $f''(x)$ の符号が変わらないとき, 点 $(\beta, f(\beta))$ は変曲点ではない¹.

補足 曲線 $y = \frac{1}{t}$ の点 $P\left(x + \frac{1}{2}, \frac{1}{x + \frac{1}{2}}\right)$ における接線を l とし ($x > 0$), l と直線 $t = x$, $t = x + 1$ との交点をそれぞれ R , Q とする. 右の図のように $x \leq t \leq x + 1$ において, 曲線 $y = \frac{1}{t}$ および t 軸で囲まれた図形の面積と 2 つの四角形 $ABCD$ および $ABQR$ の面積との大小関係により

$$\frac{1}{x + \frac{1}{2}} < \int_x^{x+1} \frac{dt}{t} < \frac{1}{x} \quad \text{ゆえに} \quad \frac{1}{x + \frac{1}{2}} < \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$$

$$\text{したがって} \quad \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < 1 < \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+\frac{1}{2}}$$

$$\text{よって} \quad \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < e < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+\frac{1}{2}}$$

$s > 1$ とし, $x = \frac{s-1}{2}$ を上式に代入すると

$$\left(1 + \frac{2}{s-1}\right)^{\frac{s-1}{2}} < e < \left(1 + \frac{2}{s-1}\right)^{\frac{s}{2}}$$

上式の辺々を平方すると

$$\left(\frac{s+1}{s-1}\right)^{s-1} < e^2 < \left(\frac{s+1}{s-1}\right)^s \quad (s > 1)$$

¹http://kumamoto.s12.xrea.com/kyusuu/kyukou/kyukou_jou-2004.pdf [1]

4 (1) $\vec{OP} = (b, a-b, 0)$, $\vec{OR} = (b, 0, a-b)$ より

$$|\vec{OP}|^2 = |\vec{OR}|^2 = b^2 + (a-b)^2, \quad \vec{OP} \cdot \vec{OR} = b^2$$

G は直線 PR 上の点であるから, 実数 t を用いて

$$\vec{OG} = (1-t)\vec{OP} + t\vec{OR}$$

とおくと, $\vec{OG} \perp \vec{PR}$ であるから, $\vec{OG} \cdot \vec{PR} = 0$ より

$$\begin{aligned} \{(1-t)\vec{OP} + t\vec{OR}\} \cdot (\vec{OR} - \vec{OP}) &= 0 \\ (t-1)|\vec{OP}|^2 + t|\vec{OR}|^2 - (2t-1)\vec{OP} \cdot \vec{OR} &= 0 \\ (2t-1)\{b^2 + (a-b)^2\} - (2t-1)b^2 &= 0 \\ (2t-1)(a-b)^2 &= 0 \end{aligned}$$

$a > b$ より, $a-b \neq 0$ であるから $t = \frac{1}{2}$

$$\text{したがって } \vec{OG} = \frac{1}{2}\vec{OP} + \frac{1}{2}\vec{OR} = \left(b, \frac{a-b}{2}, \frac{a-b}{2}\right)$$

$$\text{よって } G \left(b, \frac{a-b}{2}, \frac{a-b}{2}\right)$$

(2) 3点 P($b, a-b, 0$), Q($0, b, a-b$), R($b, 0, a-b$) より

$$\vec{QP} = (b, a-2b, b-a), \quad \vec{QR} = (b, -b, 0)$$

条件を満たすとき, $\vec{QP} \cdot \vec{QR} \leq 0$ であるから

$$b \cdot b + (a-2b) \cdot (-b) \leq 0 \quad \text{ゆえに} \quad b(3b-a) \leq 0$$

$b > 0$ であるから $3b-a \leq 0$ すなわち $a \geq 3b$

(3) (2) の結果から

$$\begin{aligned} |\vec{QP}|^2 &= b^2 + (a-2b)^2 + (b-a)^2 = 2a^2 - 6ab + 6b^2 \\ |\vec{QR}|^2 &= b^2 + (-b)^2 = 2b^2 \\ \vec{QP} \cdot \vec{QR} &= b \cdot b + (a-2b)(-b) = b(3b-a) \end{aligned}$$

したがって, $\triangle PQR$ の面積を S とすると ($a > b > 0$)

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{QP}|^2 |\vec{QR}|^2 - (\vec{QP} \cdot \vec{QR})^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(2a^2 - 6ab + 6b^2) \cdot 2b^2 - b^2(3b-a)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{3b^2(a-b)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} b(a-b) \end{aligned}$$

別解 $\overrightarrow{QP} = (b, a - 2b, b - a)$, $\overrightarrow{QR} = (b, -b, 0)$ より

$$\begin{aligned}\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{QR} &= (b(b-a), b(b-a), b(b-a)) \\ &= b(b-a)(1, 1, 1)\end{aligned}$$

したがって, $\triangle PQR$ の面積を S とすると ($a > b > 0$)

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{QP} \times \overrightarrow{QR}| = \frac{1}{2} |b(b-a)|\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} b(a-b)$$

(4) (3) の結果から $S < 10$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} b(a-b) < 10 \quad \text{ゆえに} \quad b(a-b) < \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$\text{ここで} \quad 121 < \left(\frac{20}{\sqrt{3}}\right)^2 < 144 \quad \text{ゆえに} \quad 11 < \frac{20}{\sqrt{3}} < 12$$

a, b ($a > b > 0$) は自然数であるから $b(a-b) \leq 11$

$$a \leq b + \frac{11}{b} \quad (b = 1, 2, \dots, 11)$$

$f(b) = b + \frac{11}{b}$ とすると

$$\begin{aligned}f(b+1) - f(b) &= b+1 + \frac{11}{b+1} - \left(b + \frac{11}{b}\right) \\ &= 1 - \frac{11}{b(b+1)} = \frac{b(b+1) - 11}{b(b+1)}\end{aligned}$$

したがって $f(1) > f(2) > f(3) < f(4) < \dots < f(11)$

$$f(3) = 3 + \frac{11}{3} = 6 + \frac{2}{3}$$

すべての b に対して $a \leq f(b)$ を満たす最大の自然数 a は **6** ■