

平成 23 年度 琉球大学 2 次試験前期日程 (数学問題)

理・工・医・農・教育学部 平成 23 年 2 月 25 日

- 理・工・医・教育 [数学] 学部 [1] [2] [3] [4] 数 I・II・III・A・B・C (120 分)
- 農・教育 (学校教育 [教育実践学・技術・特別支援], 生涯教育 [自然環境科学]) 学部 [5] [6] 数 I・II・A・B (60 分)

[1] 実数 p に対して, 行列 A, B, C をそれぞれ

$$A = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+p \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & -1 \end{pmatrix}$$

とおく. さらに, 行列 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を

$$A_1 = A, \quad A_{n+1} = A_n B - B A_n + C \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める. 次の問いに答えよ.

- (1) A_2, A_3 を求めよ.
 - (2) A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を推測し, その推測が正しいことを数学的帰納法を用いて示せ.
- [2] 中心が $(2, 0, 1)$, 半径が $2\sqrt{5}$ の球面が yz 平面と交わってできる円を C とする. 次の問いに答えよ.
- (1) C の中心の座標と半径を求めよ.
 - (2) 点 P は C 上を動き, 点 Q は xy 平面上の直線 $x = y$ 上を動くとする. 線分 PQ の長さの最小値, およびそのときの P, Q の座標を求めよ.
- [3] 1 から 4 までの番号を 1 つずつ書いた 4 枚のカードがある. この中から 1 枚を抜き取り, 番号を記録してもとに戻す. これを n 回繰り返したとき, 記録された n 個の数の最大公約数を X とする. ただし, n は 2 以上の自然数とする. 次の問いに答えよ.
- (1) $X = 3$ となる確率と $X = 4$ となる確率を n を用いて表せ.
 - (2) $X = 2$ となる確率を n を用いて表せ.
 - (3) X の期待値を n を用いて表せ.

4 次の問いに答えよ.

(1) 定積分 $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin 2x dx$ を求めよ.

(2) m, n が自然数のとき, 定積分 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx$ を求めよ.

(3) a, b を実数とする. a, b の値を変化させたときの定積分

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \sin x - b \sin 2x)^2 dx$$

の最小値, およびそのときの a, b の値を求めよ.

5 次の問いに答えよ.

(1) $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$ の整数部分を a , 小数部分を b とする. このとき, $a^2 + ab + b^2$ と $\frac{1}{a-b-1} - \frac{1}{a+b+1}$ の値を求めよ.

(2) 3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx - 14 = 0$ の1つの解が $2 + \sqrt{3}i$ であるとき, 実数の定数 a, b の値を求めよ.

(3) 次の方程式を解け.

$$\log_5(1 - 4 \cdot 5^x) = 2x + 1$$

6 放物線 $y = x^2$ 上の異なる2点 $P(p, p^2), Q(q, q^2)$ における接線が点 R で交わっている. 次の問いに答えよ.

(1) R の座標を求めよ.

(2) $p = -1, q = 2$ のとき, 2本の接線と放物線で囲まれた図形の面積を求めよ.

解答例

1 (1) $A_2 = AB - BA + C$ より

$$\begin{aligned} A_2 &= \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & p+p^2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & p+p^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$A_3 = A_2B - BA_2 + C$ より

$$\begin{aligned} A_3 &= \begin{pmatrix} 0 & p+p^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+p \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & p+p^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & p+2p^2+p^3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & p+p^2 \\ 1+p & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & p+p^2+p^3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2) $A_n = \begin{pmatrix} 0 & p + p^2 + \cdots + p^n \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdots (*)$ と推測する.

i) $n = 1$ のとき, $(*)$ は成り立つ.

ii) $n = k$ のとき

$$A_k = \begin{pmatrix} 0 & p + p^2 + \cdots + p^k \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

が成り立つと仮定すると

$$\begin{aligned} A_{k+1} &= A_k B - B A_k + C \\ &= \begin{pmatrix} 0 & p + p^2 + \cdots + p^k \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+p \end{pmatrix} \\ &\quad - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1+p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & p + p^2 + \cdots + p^k \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & p + 2p^2 + \cdots + 2p^k + p^{k+1} \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\quad - \begin{pmatrix} 1 & p + p^2 + \cdots + p^k \\ 1+p & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & p \\ 1+p & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & p + p^2 + \cdots + p^{k+1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

よって, $n = k + 1$ のときも $(*)$ が成り立つ.

i), ii) より, すべての自然数 n について, $(*)$ が成り立つ. ■

- 2** (1) 中心 $(2, 0, 1)$, 半径 $2\sqrt{5}$ の球面の方程式は

$$(x-2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = (2\sqrt{5})^2$$

この球面と yz 平面と交わってできる円の方程式は, $x=0$ を代入して

$$(0-2)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 20 \quad \text{ゆえに} \quad y^2 + (z-1)^2 = 16$$

よって 中心 $(0, 0, 1)$, 半径 4 の円

- (2) (1) の結果から, C 上の点 P の座標を $(0, 4\cos\theta, 4\sin\theta + 1)$ とおく.
また, xy 平面上の直線 $x=y$ 上の点 Q の座標を $(t, t, 0)$ とおく.

$$\begin{aligned} PQ^2 &= t^2 + (t - 4\cos\theta)^2 + (4\sin\theta + 1)^2 \\ &= 2t^2 - 8t\cos\theta + 8\sin\theta + 17 \\ &= 2(t - 2\cos\theta)^2 - 8\cos^2\theta + 8\sin\theta + 17 \\ &= 2(t - 2\cos\theta)^2 + 8\sin^2\theta + 8\sin\theta + 9 \\ &= 2(t - 2\cos\theta)^2 + 8\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\right)^2 + 7 \end{aligned}$$

$$PQ \text{ が最小となるとき} \quad t = 2\cos\theta, \quad \sin\theta = -\frac{1}{2}$$

$$\text{ゆえに} \quad \cos\theta = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad t = \pm\sqrt{3}$$

よって $P(0, \pm 2\sqrt{3}, -1)$, $Q(\pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{3}, 0)$ (複号同順) のとき,
PQ の最小値 $\sqrt{7}$ ■

- 3** (1) $X=3$ となるのは, n 回とも 3 であるから, その確率は $\left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$

$$X=4 \text{ となるのは, } n \text{ 回とも 4 であるから, その確率は } \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$$

- (2) $X=2$ となるのは, n 回とも 2 または 4 である場合から, n 回とも 4 である場合を除いたものであるから, その確率は

$$\left(\frac{2}{4}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}$$

- (3) $X=1$ の確率は, $x=2, 3, 4$ の余事象の確率であるから

$$1 - \left\{ \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right) + \frac{1}{4^n} + \frac{1}{4^n} \right\} = 1 - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}$$

よって, 求める期待値は

$$1 \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right) + 3 \cdot \frac{1}{4^n} + 4 \cdot \frac{1}{4^n} = 1 + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{4^{n-1}}$$
■

$$\begin{aligned}
 \boxed{4} \quad (1) \quad \int_{-\pi}^{\pi} x \sin 2x \, dx &= \int_{-\pi}^{\pi} x \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right)' dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2} x \cos 2x \right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) dx \\
 &= -\pi + \left[\frac{1}{4} \sin 2x \right]_{-\pi}^{\pi} = -\pi
 \end{aligned}$$

(2) $m \neq n$ のとき

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \{ \cos(m-n)x - \cos(m+n)x \} dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{m-n} \sin(m-n)x - \frac{1}{m+n} \sin(m+n)x \right]_{-\pi}^{\pi} = 0
 \end{aligned}$$

$m = n$ のとき

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2mx) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[x - \frac{1}{2m} \sin 2mx \right]_{-\pi}^{\pi} = \pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \, dx &= \int_{-\pi}^{\pi} x (-\cos x)' dx \\
 &= \left[-x \cos x \right]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} (-\cos x) dx \\
 &= 2\pi + \left[\sin x \right]_{-\pi}^{\pi} = 2\pi
 \end{aligned}$$

上式および, (1), (2) の結果を用いて

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \sin x - b \sin 2x)^2 dx \\
 &= \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx + a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x dx + b^2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 2x dx \\
 &\quad - 2a \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx - 2b \int_{-\pi}^{\pi} x \sin 2x dx + 2ab \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \sin 2x dx \\
 &= \frac{2}{3} \pi^3 + a^2 \pi + b^2 \pi - 2a \cdot 2\pi - 2b \cdot (-\pi) + 2ab \cdot 0 \\
 &= \pi a^2 - 4\pi a + \pi b^2 + 2\pi b + \frac{2}{3} \pi^3 \\
 &= \pi(a-2)^2 + \pi(b+1)^2 + \frac{2}{3} \pi^3 - 5\pi
 \end{aligned}$$

よって $a = 2, b = -1$ のとき最小値 $\frac{2}{3} \pi^3 - 5\pi$

解説 空間のベクトル $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$, $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ が, 次の諸式をみたすとする.

$$|\vec{p}|^2 = \frac{2}{3}\pi^3, \quad |\vec{u}|^2 = |\vec{v}|^2 = \pi, \quad \vec{p} \cdot \vec{u} = 2\pi, \quad \vec{p} \cdot \vec{v} = -\pi, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

ここで, P から平面 OAB に垂線 PH を下すと, 定数 a_0, b_0 を用いて

$$\overrightarrow{OH} = a_0\vec{u} + b_0\vec{v} \quad \text{ゆえに} \quad \overrightarrow{HP} = \vec{p} - a_0\vec{u} - b_0\vec{v}$$

となる. このとき, $\overrightarrow{HP} \perp \vec{u}$, $\overrightarrow{HP} \perp \vec{v}$ であるから $a_0 = 2, b_0 = -1$

平面 OAB 上の任意の点 Q を $\overrightarrow{OQ} = a\vec{u} + b\vec{v}$ とすると

$$|\overrightarrow{QP}| \geq |\overrightarrow{HP}|$$

したがって, 任意の実数 a, b に対して

$$|\vec{p} - a\vec{u} - b\vec{v}|^2 \geq |\vec{p} - 2\vec{u} + \vec{v}|^2$$

$$\text{すなわち} \quad (\vec{p} - a\vec{u} - b\vec{v}) \cdot (\vec{p} - a\vec{u} - b\vec{v}) \geq (\vec{p} - 2\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{p} - 2\vec{u} + \vec{v})$$

以上のことから, x の関数 $f_1(x) = x$, $f_2(x) = \sin x$, $f_3(x) = \sin 2x$ の内積を

$$\langle f_i(x), f_j(x) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f_i(x) f_j(x) dx \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

と定義すると, 任意の実数 a, b に対して

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \sin x - b \sin 2x)^2 dx \\ &= \langle x - a \sin x - b \sin 2x, x - a \sin x - b \sin 2x \rangle \\ &\geq \langle x - 2 \sin x + \sin 2x, x - 2 \sin x + \sin 2x \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + 4 \langle \sin x, \sin x \rangle + \langle \sin 2x, \sin 2x \rangle \\ &\quad - 4 \langle x, \sin x \rangle + 2 \langle x, \sin 2x \rangle - 4 \langle \sin x, \sin 2x \rangle \\ &= \frac{2}{3}\pi^3 + 4\pi + \pi - 4 \cdot 2\pi + 2(-\pi) - 4 \cdot 0 = \frac{2}{3}\pi^3 - 5\pi \end{aligned}$$



5 (1) $\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3} + 1 = 2 + (\sqrt{3} - 1)$ ゆえに $a = 2, b = \sqrt{3} - 1$

したがって

$$\begin{aligned} a^2 + ab + b^2 &= 2^2 + 2(\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} - 1)^2 = 6 \\ \frac{1}{a-b-1} - \frac{1}{a+b+1} &= \frac{1}{2 - (\sqrt{3} - 1) - 1} - \frac{1}{2 + (\sqrt{3} - 1) + 1} \\ &= \frac{1}{2 - \sqrt{3}} - \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

(2) 実数を係数とする3次方程式の解の1つが $2 + \sqrt{3}i$ であるから、他の解は $2 - \sqrt{3}i$ で、これらを α, β とする。また残りの解を γ とおくと

$$\alpha + \beta = 4, \quad \alpha\beta = 7$$

3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx - 14 = 0$ の解と係数の関係により

$$\alpha + \beta + \gamma = -a, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = b, \quad \alpha\beta\gamma = 14$$

したがって

$$\begin{array}{lll} (\alpha + \beta) + \gamma = -a & \alpha\beta + \gamma(\alpha + \beta) = b & \alpha\beta\gamma = 14 \\ 4 + \gamma = -a & 7 + 4\gamma = b & 7\gamma = 14 \end{array}$$

上の第3式から $\gamma = 2$ これを第1式、第2式に代入すると $a = -6, b = 15$

(3) $\log_5(1 - 4 \cdot 5^x) = 2x + 1$ より

$$5^{2x+1} = 1 - 4 \cdot 5^x \quad \text{ゆえに} \quad 5 \cdot 5^{2x} + 4 \cdot 5^x - 1 = 0$$

$X = 5^x$ とおくと $5X^2 + 4X - 1 = 0$ ゆえに $(X+1)(5X-1) = 0$

$X > 0$ に注意して $X = \frac{1}{5}$ すなわち $5^x = 5^{-1}$ よって $x = -1$ ■

6 (1) $y = x^2$ を微分すると $y' = 2x$

ゆえに, $P(p, p^2)$ における接線の方程式は

$$y - p^2 = 2p(x - p) \quad \text{すなわち} \quad y = 2px - p^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

同様に, $Q(q, q^2)$ における接線の方程式は $y = 2qx - q^2 \quad \dots \textcircled{2}$

R の座標は, ①, ② を解いて $\left(\frac{p+q}{2}, pq\right)$

(2) $p = -1, q = 2$ より, $y = x^2$ の P, Q における接線の方程式は, それぞれ

$$y = -2x - 1, \quad y = 4x - 4$$

また, R の x 座標は $x = \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2}$

よって, 求める面積を S とすると

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \{x^2 - (-2x - 1)\} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 \{x^2 - (4x - 4)\} dx \\ &= \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (x+1)^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (x-2)^2 dx \\ &= \left[\frac{1}{3}(x+1)^3 \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} + \left[\frac{1}{3}(x-2)^2 \right]_{\frac{1}{2}}^2 \\ &= \frac{9}{8} + \frac{9}{8} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

解説 直線 PQ と放物線で囲まれた部分の面積を S_1 とすると

$$S = \frac{1}{2} S_1$$

が成り立つ. 九大 2009 年一般前期文系数学 [4] の補足¹を参照. ■

¹http://kumamoto.s12.xrea.com/nyusi/Qdai_bun-2009.pdf