

平成 18 年度 熊本保健科学大学一般前期入学試験問題
 看護学科 数学 I・数学 II(平成 18 年 2 月 4 日)

1 次の各問い(問 1~5)に答えなさい。

問 1 $-2 \leq x \leq 2$ のとき ,

$$|x+2| + |x-2| = x+3 \text{ を満たす } x \text{ の値を求めなさい。}$$

問 2 $x^4 - 13x^2 + 36$ を因数分解しなさい。

問 3 2 次方程式 $6x^2 - 7x + 2 = 0$ を解きなさい。

問 4 放物線 $y = 2x^2$ を平行移動したところ , 点 $(2, -1)$ を通り , 頂点が直線 $y = -x - 2$ 上の点となった。平行移動後の放物線の方程式を求めなさい。

問 5 不等式 $ax^2 - 2x + a + 2 > 0$ がすべての x に対して成り立つとき , 定数 a の値の範囲を求めなさい。

2 次の各問い(問 1~5)に答えなさい。

問 1 2 次方程式 $x^2 + 4x - 2 = 0$ の解を α, β とする。このとき , 2 つの解が $2\alpha + 1, 2\beta + 1$ で , x^2 の係数が 1 である 2 次方程式を求めなさい。

問 2 整式 $f(x)$ は , $2x + 1$ で割ると 2 余り , $x - 3$ で割ると -5 余る。このとき , $f(x)$ を $2x^2 - 5x - 3$ で割ったときの余りを求めなさい。

問 3 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき , $-\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta - 1 = 0$ を満たす θ の値の求めなさい。

問 4 方程式 $2 \log_3(x+2) = \log_3(4-x)$ を解きなさい。

問 5 2 点 $(-2, -1), (4, 3)$ を直径の両端とする円の方程式を求めなさい。

3 $AB = 10$, $AC = 8$, $\angle A = 60^\circ$ である三角形 ABC があり, $\angle A$ の二等分線と辺 BC との交点を M とする。このとき, 次の各問い合わせ(問 1~3)に答えなさい。

問 1 BC の長さと三角形 ABC の外接円の半径を求めなさい。

問 2 三角形 ABC の面積を求めなさい。また, 三角形 ABC の面積を利用して, AM の長さを求めなさい。

問 3 直線 AM と三角形 ABC の外接円との交点のうち A でないものを D とすると, CD の長さを求めなさい。なお「円に内接する四角形の向かい合う角の和は 180° である。」という性質を用いてもよい。

4 3 次関数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ は次の条件を満たしている。

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -2, \quad f'(0) = -3, \quad f'(1) = 0$$

このとき, 次の各問い合わせ(問 1~3)に答えなさい。

問 1 a, b, c, d の値を求めなさい。

問 2 $-3 \leq x \leq \sqrt{3}$ における関数 $y = f(x)$ の最大値と最小値, およびそのときの x の値を求めなさい。

問 3 3 次方程式 $f(x) - k = 0$ が $-3 \leq x \leq \sqrt{3}$ の範囲に異なる実数解を少なくとも 2 個もつとき, 定数 k の値の範囲を求めなさい。

解答例

1 問 1 $-2 \leq x \leq 2$ のとき , $x + 2 \geq 0$, $x - 2 \leq 0$ であるから

$$|x + 2| = x + 2, \quad |x - 2| = -(x - 2) = -x + 2$$

$$\text{したがって} \quad x + 2 + (-x + 2) = x + 3$$

$$-2 \leq x \leq 2 \text{ に注意して} \quad x = 1$$

$$\begin{aligned} \text{問 2 } x^4 - 13x^2 + 36 &= (x^2 - 4)(x^2 - 9) \\ &= (x + 2)(x - 2)(x + 3)(x - 3) \end{aligned}$$

$$\text{問 3 左辺を因数分解すると} \quad (2x - 1)(3x - 2) = 0$$

$$\text{よって} \quad 2x - 1 = 0 \quad \text{または} \quad 3x - 2 = 0$$

$$\text{したがって , 解は} \quad x = \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$$

【別解】解の公式により

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 2}}{2 \cdot 6} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{1}}{12} = \frac{7 \pm 1}{12} \\ &= \frac{8}{12}, \frac{6}{12} = \frac{2}{3}, \frac{1}{2} \end{aligned}$$

問 4 直線 $y = -x - 2$ 上に放物線の頂点があるので , 頂点の座標を $(p, -p - 2)$ とする . この放物線は $y = 2x^2$ のグラフを平行移動したものであるから

$$y = 2(x - p)^2 - p - 2 \quad \cdots ①$$

とおける . ① は点 $(2, -1)$ を通るので

$$-1 = 2(2 - p)^2 - p - 2$$

$$\text{整理して} \quad 2p^2 - 9p + 7 = 0$$

$$\text{左辺を因数分解して} \quad (p - 1)(2p - 7) = 0$$

$$\text{したがって} \quad p = 1, \frac{7}{2}$$

$$\text{よって , ① から} \quad y = 2(x - 1)^2 - 3, \quad y = 2\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{11}{2}$$

問5 不等式 $ax^2 - 2x + a + 2 > 0$ がすべての x について成り立つためには、 x^2 の係数は正、 $D < 0$ を満たせばよいから

x^2 の係数について

$$a > 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$D < 0$ であるから

$$(-2)^2 - 4 \cdot a(a+2) < 0$$

整理して

$$-4a^2 - 8a + 4 < 0$$

-4で割って

$$a^2 + 2a - 1 > 0$$

これを解いて

$$a < -1 - \sqrt{2}, \quad -1 + \sqrt{2} < a \quad \cdots \textcircled{2}$$


①, ②の共通範囲を求めて $a > -1 + \sqrt{2}$

研究

2次関数 $y = ax^2 + bx + c$ は、 $D < 0$ のとき x 軸との共有点は存在しないことから、 y の値は定符号となる。このとき a の符号により

$$a > 0, D < 0 \iff \text{常に } y > 0$$

$$a < 0, D < 0 \iff \text{常に } y < 0$$



2次式の定符号

$$\text{常に } ax^2 + bx + c > 0 \iff a > 0, D < 0$$

$$\text{常に } ax^2 + bx + c < 0 \iff a < 0, D < 0$$

[補足] 常に $ax^2 + bx + c \geq 0 \iff a > 0, D \leq 0$

常に $ax^2 + bx + c \leq 0 \iff a < 0, D \leq 0$

2 問1 2次方程式 $x^2 + 4x - 2 = 0$ の解と係数の関係から

$$\alpha + \beta = -\frac{4}{1} = -4, \quad \alpha\beta = \frac{-2}{1} = -2$$

$$\begin{aligned} \text{ここで} \quad (2\alpha + 1) + (2\beta + 1) &= 2(\alpha + \beta) + 2 \\ &= 2 \cdot (-4) + 2 = -6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2\alpha + 1)(2\beta + 1) &= 4\alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 1 \\ &= 4 \cdot (-2) + 2 \cdot (-4) + 1 = -15 \end{aligned}$$

よって、求める2次方程式は

$$x^2 - (-6)x - 15 = 0 \quad \text{すなわち} \quad x^2 + 6x - 15 = 0$$

問2 $f(x)$ を $2x^2 - 5x - 3$ で割ったときの余りを $ax + b$ とおいて、商を $Q(x)$ とすると、次の等式が成り立つ。

$$\begin{aligned} f(x) &= (2x^2 - 5x - 3)Q(x) + ax + b \\ &= (2x + 1)(x - 3)Q(x) + ax + b \end{aligned}$$

$$\text{この等式より} \quad f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}a + b, \quad f(3) = 3a + b$$

$$\begin{aligned} \text{また, } 2x + 1 \text{ で割った余りが } 2 \text{ であるから} \quad f\left(-\frac{1}{2}\right) &= 2 \\ x - 3 \text{ で割った余りが } -5 \text{ であるから} \quad f(3) &= -5 \end{aligned}$$

$$\text{よって} \quad -\frac{1}{2}a + b = 2, \quad 3a + b = -5$$

$$\text{これを解くと} \quad a = -2, \quad b = 1$$

$$\text{したがって、求める余りは} \quad -2x + 1$$

問3 与式から $\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta = -1$

$$\text{左辺を変形すると} \quad 2 \sin(\theta - 60^\circ) = -1$$

$$\text{よって} \quad \sin(\theta - 60^\circ) = -\frac{1}{2} \quad \cdots \text{①}$$


$0^\circ \leq \theta < 180^\circ$ のとき

$$-60^\circ \leq \theta - 60^\circ < 120^\circ$$

であるから、この範囲で ① を解くと

$$\theta - 60^\circ = -30^\circ$$

$$\text{したがって} \quad \theta = 30^\circ$$



問4 真数は正であるから	$x + 2 > 0$	かつ	$4 - x > 0$	
すなわち	$-2 < x < 4$			$\cdots \textcircled{1}$
方程式を変形すると	$\log_3(x + 2)^2 = \log_3(4 - x)$			
よって	$(x + 2)^2 = 4 - x$			
整理して	$x^2 + 5x = 0$			
したがって	$x(x + 5) = 0$			
①に注意して	$x = 0$			

問5 2点 $(-2, -1), (4, 3)$ をそれぞれA, B, 円の中心をC, 半径を r とする。
Cは線分ABの中点であるから, その座標は

$$\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{-1+3}{2} \right) \text{ すなわち } (1, 1)$$

また $r = CA = \sqrt{(-2-1)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{13}$

この円の方程式は

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = (\sqrt{13})^2$$

すなわち $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 13$

3 問 1 $\triangle ABC$ を余弦定理に適用して

$$\begin{aligned} BC^2 &= CA^2 + AB^2 - 2CA \cdot AB \cos A \\ &= 8^2 + 10^2 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cos 60^\circ \\ &= 64 + 100 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 84 \end{aligned}$$

$BC > 0$ であるから

$$BC = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}$$

$\triangle ABC$ の外接円の半径を R とすると、正弦定理により

$$\frac{BC}{\sin A} = 2R$$

が成り立つから

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} \times \frac{BC}{\sin A} = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{21}}{\sin 60^\circ} \\ &= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{21} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

問 2 $\triangle ABC = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}$

$AM = x$ とおく。 $\triangle ABM + \triangle ACM = \triangle ABC$ であるから

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot 10x \sin 30^\circ + \frac{1}{2} \cdot 8x \sin 30^\circ &= 20\sqrt{3} \\ \frac{5}{2}x + 2x &= 20\sqrt{3} \\ x &= \frac{40}{9}\sqrt{3} \end{aligned}$$

問 3 $\angle BDC = 180^\circ - \angle BAC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, $BD = CD$ であるから、 $BD = CD = y$ とおいて、 $\triangle BCD$ を余弦定理に適用すると


$$BC^2 = BD^2 + CD^2 - 2BD \cdot CD \cos 120^\circ$$

$$(2\sqrt{21})^2 = y^2 + y^2 - 2y \cdot y \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$84 = 3y^2$$

$$y^2 = 28$$

$y > 0$ であるから $y = 2\sqrt{7}$ すなわち $CD = 2\sqrt{7}$



4 問 1 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

$$f(0) = 0 \text{ から} \quad d = 0 \quad \cdots ①$$

$$f(1) = -2 \text{ から} \quad a + b + c + d = -2 \quad \cdots ②$$

$$f'(0) = -3 \text{ から} \quad c = -3 \quad \cdots ③$$

$$f'(1) = 0 \text{ から} \quad 3a + 2b + c = 0 \quad \cdots ④$$

$$①, ③ \text{ を } ② \text{ に代入して} \quad a + b = 1 \quad \cdots ⑤$$

$$③ \text{ を } ④ \text{ に代入して} \quad 3a + 2b = 3 \quad \cdots ⑥$$

$$⑤, ⑥ \text{ を解いて} \quad a = 1, b = 0$$

(答) $a = 1, b = 0, c = -3, d = 0$

問 2 問 1 の結果から


$$y = x^3 - 3x$$

$$y' = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$$y' = 0 \text{ とすると} \quad x = -1, 1$$

y の増減表は、次のようになる。

x	-3	…	-1	…	1	…	$\sqrt{3}$
y'		+	0	-	0	+	
y	-18	↗	極大 2	↘	極小 -2	↗	0



よって、この関数は

$x = -1$ で最大値 2 をとり、

$x = -3$ で最小値 -18 をとる。

問 3 求める k の値の範囲は、 $y = x^3 - 3x$ ($-3 \leq x \leq \sqrt{3}$) のグラフと直線 $y = k$ が少なくとも 2 個の共有点をもつ範囲であるから

$$-2 \leq k < 2$$