

平成23年度 熊本大学2次試験前期日程(数学問題)120分  
 医学部医学科 平成23年2月25日


問題 1 2 3 4

1  $x, y$  を整数とするととき、以下の問いに答えよ。

- (1)  $x^5 - x$  は30の倍数であることを示せ。
- (2)  $x^5y - xy^5$  は30の倍数であることを示せ。

2 平行六面体 OADB-CEGF において、辺 OA の中点を M、辺 AD を 2 : 3 に内分する点を N、辺 DG を 1 : 2 に内分する点を L とする。また、辺 OC を  $k : 1 - k$  ( $0 < k < 1$ ) に内分する点を K とする。このとき、以下の問いに答えよ。

- (1)  $\vec{OA} = \vec{a}$ ,  $\vec{OB} = \vec{b}$ ,  $\vec{OC} = \vec{c}$  とするとき、 $\vec{MN}$ ,  $\vec{ML}$ ,  $\vec{MK}$  を  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  を用いて表せ。
- (2) 3点 M, N, K の定める平面上に点 L があるとき、 $k$  の値を求めよ。
- (3) 3点 M, N, K の定める平面が辺 GF と交点をもつような  $k$  の値の範囲を求めよ。



**3** 楕円  $C: x^2 + 4y^2 = 4$  と点  $P(2, 0)$  を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) 直線  $y = x + b$  が楕円  $C$  と異なる 2 つの交点をもつような  $b$  の値の範囲を求めよ。
- (2) (1) における 2 つの交点を  $A, B$  とするとき、三角形  $PAB$  の面積が最大となるような  $b$  の値を求めよ。

**4**  $xyz$  空間内の 3 点  $P(0, 0, 1)$ ,  $Q(0, 0, -1)$ ,  $R(t, t^2 - t + 1, 0)$  を考える。 $t$  が  $0 \leq t \leq 2$  の範囲を動くとき、三角形  $PQR$  が通過してできる立体を  $K$  とする。以下の問いに答えよ。

- (1)  $K$  を  $xy$  平面で切ったときの断面積を求めよ。
- (2)  $K$  の体積を求めよ。

## 解答例

$$\begin{aligned}
 \boxed{1} \quad (1) \quad x^5 - x &= x(x^2 + 1)(x^2 - 1) \\
 &= x\{(x^2 - 4) + 5\}(x^2 - 1) \\
 &= (x - 2)(x - 1)x(x + 1)(x + 2) + 5(x - 1)x(x + 1) \\
 (x - 2)(x - 1)x(x + 1)(x + 2) &\text{は連続する5整数の積で5!の倍数であり,} \\
 5(x - 1)x(x + 1) &\text{は5}\cdot\text{3!の倍数であるから, } x^5 - x \text{は30の倍数である.}
 \end{aligned}$$

別解 2項定理により

$$(a + b)^5 - a^5 - b^5 = \sum_{j=1}^4 {}_5C_j a^{5-j} b^j$$

${}_5C_j$  ( $1 \leq j \leq 4$ ) は5の倍数であるから,  $a, b$  が整数であるとき, 上式は5の倍数である.  $k$  が整数のとき,  $a = k - 1, b = 1$  とし, 数列  $\{a_k\}$  を

$$a_k = k^5 - (k - 1)^5 - 1$$

とおく. この数列の初項から第  $n$  項までの和を求めると

$$\sum_{k=1}^n a_k = n^5 - n$$

$a_k$  は5の倍数であるから, 自然数  $n$  について,  $n^5 - n$  は5の倍数である. また, 負の整数  $m$  について,  $m = -n$  とすると

$$m^5 - m = (-n)^5 - (-n) = -(n^5 - n)$$

したがって, 上式は5の倍数である.

$x = 0$  のとき,  $x^5 - x$  が5の倍数であることは明らか. 以上のことから,  $x$  が整数であるとき,  $x^5 - x$  は5の倍数である. 次に

$$x^5 - x = (x - 1)x(x + 1)(x^2 + 1)$$

であるから, 上式は連続する3数の積を因数にもち,  $2 \times 3$  の倍数である. よって,  $x^5 - x$  は  $2 \times 3 \times 5$ , すなわち, 30の倍数である.


$$(2) \quad x^5 y - x y^5 = y(x^5 - x) - x(y^5 - y)$$

(1)の結果により  $x, y$  が整数のとき,  $x^5 - x, y^5 - y$  は30の倍数であるから, 上式は, 30の倍数である. ■

$$\begin{aligned} \text{[2]} \quad (1) \quad \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} \\ &= \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{ML} &= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DL} \\ &= \frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MK} &= \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OK} \\ &= -\frac{1}{2}\vec{a} + k\vec{c} \end{aligned}$$



- (2) 3点M, N, Kを通る平面を $\alpha$ とする.  $\alpha$ 上の点Pの位置ベクトル $\vec{p}$ は,  
(1)の結果から, 実数 $s, t$ を用いて

$$\begin{aligned} \vec{p} &= \overrightarrow{OM} + s\overrightarrow{MN} + t\overrightarrow{MK} \\ &= \frac{1}{2}\vec{a} + s\left(\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}\right) + t\left(-\frac{1}{2}\vec{a} + k\vec{c}\right) \\ &= \frac{1}{2}(1+s-t)\vec{a} + \frac{2}{5}s\vec{b} + tk\vec{c} \quad \dots (*) \end{aligned}$$

点Lの位置ベクトルは, $\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ であるから, Lが $\alpha$ 上の点であるとき,  
 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ は1次独立であるから

$$\frac{1}{2}(1+s-t) = 1, \quad \frac{2}{5}s = 1, \quad tk = \frac{1}{3}$$

これを解いて  $s = \frac{5}{2}, t = \frac{3}{2}, k = \frac{2}{9}$

- (3)  $\overrightarrow{OF} = \vec{b} + \vec{c}, \overrightarrow{FG} = \vec{a}$ より, 辺GF上の点の位置ベクトルは実数 $x$ を用いて

$$\overrightarrow{OF} + x\overrightarrow{FG} = x\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$\alpha$ と辺GFが交点をもつとき, 上式および(\*)から

$$\frac{1}{2}(1+s-t) = x, \quad \frac{2}{5}s = 1, \quad tk = 1$$

第1式および第2式から  $t = \frac{7}{2} - 2x$

$0 \leq x \leq 1$ であるから  $\frac{3}{2} \leq t \leq \frac{7}{2}$

$0 < k < 1$ に注意しながら, これと第3式により  $\frac{2}{7} \leq k \leq \frac{2}{3}$  ■

**3** (1)  $x^2 + 4y^2 = 4 \cdots \textcircled{1}$ ,  $y = x + b \cdots \textcircled{2}$  とおく.

$\textcircled{1}$ ,  $\textcircled{2}$  から  $y$  を消去して整理すると

$$5x^2 + 8bx + 4(b^2 - 1) = 0 \quad \cdots \textcircled{3}$$

この方程式の判別式を  $D$  とすると

$$D/4 = (4b)^2 - 5 \cdot 4(b^2 - 1) = 4(5 - b^2)$$

$\textcircled{1}$ ,  $\textcircled{2}$  が異なる 2 つの交点をもつとき,  $D > 0$  であるから

$$5 - b^2 > 0 \quad \text{これを解いて} \quad -\sqrt{5} < b < \sqrt{5}$$

(2) 2 つの交点 A, B の  $x$  座標を, それぞれ  $\alpha$ ,  $\beta$  とすると,  $A(\alpha, \alpha + b)$ ,  $B(\beta, \beta + b)$  であるから, 三角形 PAB の面積を  $S$  とすると

$$\overrightarrow{PA} = (\alpha - 2, \alpha + b), \quad \overrightarrow{PB} = (\beta - 2, \beta + b)$$

$$\text{ゆえに} \quad S = \frac{1}{2} |(\alpha - 2)(\beta + b) - (\beta - 2)(\alpha + b)| = \frac{1}{2} |(b + 2)(\alpha - \beta)|$$

$$\textcircled{3} \text{ の解は } x = \frac{-4b \pm 2\sqrt{5 - b^2}}{5} \text{ であるから } |\alpha - \beta| = \frac{4}{5} \sqrt{5 - b^2}$$

$$\text{したがって} \quad S = \frac{2}{5} |b + 2| \sqrt{5 - b^2} = \frac{2}{5} \sqrt{(b + 2)^2 (5 - b^2)}$$

ここで,  $f(b) = (b + 2)^2 (5 - b^2)$  ( $-\sqrt{5} < b < \sqrt{5}$ ) とおくと,  $S$  を最大にする  $b$  の値は,  $f(b)$  を最大にする  $b$  の値であるから

$$f'(b) = -2(b + 2)(2b^2 + 2b - 5)$$

$$-\sqrt{5} < b < \sqrt{5} \text{ に注意して, } f'(b) = 0 \text{ を解くと } b = -2, \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{2}$$

$f(b)$  の増減表は, 次のようになる.

$b$	$-\sqrt{5}$	$\cdots$	$\frac{-1 - \sqrt{11}}{2}$	$\cdots$	$-2$	$\cdots$	$\frac{-1 + \sqrt{11}}{2}$	$\cdots$	$\sqrt{5}$
$f'(b)$		$+$	$0$	$-$	$0$	$+$	$0$	$-$	
$f(b)$		$\nearrow$	極大	$\searrow$	極小	$\nearrow$	極大	$\searrow$	

$f(b) = (2b^2 + 2b - 5)(-\frac{1}{2}b^2 - \frac{3}{2}b + \frac{3}{4}) + 11b + \frac{95}{4}$  であるから

$$f\left(\frac{-1 - \sqrt{11}}{2}\right) < f\left(\frac{-1 + \sqrt{11}}{2}\right)$$

よって, 求める  $b$  の値は  $\frac{-1 + \sqrt{11}}{2}$

- 別解 (1)  $C: x^2 + 4y^2 = 4$  および直線  $l: y = x + b$  を  $x$  軸を元に  $y$  軸方向に 2 倍に拡大した図形を, それぞれ,  $C': x^2 + y^2 = 4$ ,  $l': y = 2x + 2b$  とする.  $C$  と  $l$  が異なる 2 つの交点をもつとき,  $C'$  と  $l'$  は異なる 2 つの交点をもつから

$$\frac{|2b|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} < 2 \quad \text{これを解いて} \quad -\sqrt{5} < b < \sqrt{5}$$

- (2)  $C'$  と  $l'$  の交点を  $A'$ ,  $B'$  とし,  $\triangle PAB$ ,  $\triangle PA'B'$  の面積を, それぞれ,  $S$ ,  $S'$  とすると,  $S' = 2S$  が成り立つ.  $S'$  が最大となるとき,  $S$  は最大となるから,  $S'$  を最大にする  $b$  の値を求めればよい.

原点  $O$  から  $l'$  までの距離を  $d$  とすると

$$d = \frac{|2b|}{\sqrt{5}}$$

$$A'B' = 2\sqrt{2^2 - d^2} = \frac{4\sqrt{5 - b^2}}{\sqrt{5}}$$

$S'$  を最大にする  $b$  は, 右の図から

$$0 < b < \sqrt{5}$$

の範囲で調べればよい.  $P$  から  $l'$  に引いた垂線の長さを  $h$  とすると

$$h = \frac{2b}{\sqrt{5}} + \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{2b + 4}{\sqrt{5}}$$

$$S' = \frac{1}{2}A'B' \cdot h = \frac{4}{5}(b + 2)\sqrt{5 - b^2}$$

$$S = \frac{1}{2}S' = \frac{2}{5}(b + 2)\sqrt{5 - b^2} = \frac{2}{5}\sqrt{(b + 2)^2(5 - b^2)}$$

したがって, 関数

$$f(b) = (b + 2)^2(5 - b^2) \quad (0 < b < \sqrt{5})$$

を最大にする  $b$  の値を求めればよい.


$$f'(b) = -2(b + 2)(2b^2 + 2b - 5)$$

$0 < b < \sqrt{5}$  に注意して  $f'(b) = 0$  を解くと  $b = \frac{-1 + \sqrt{11}}{2}$

$f(b)$  の増減は, 右のようになる. よって, 求める  $b$  の値は

$$b = \frac{-1 + \sqrt{11}}{2}$$

$b$	(0)	...	$\frac{-1 + \sqrt{11}}{2}$	...	$(\sqrt{5})$
$f'(b)$		+	0	-	
$f(b)$		↗	極大	↘	



- 4 (1) R は,  $xy$  平面上の放物線  $y = x^2 - x + 1$  ( $0 \leq x \leq 2$ ) 上を動く.  
放物線と原点を通る直線  $y = kx$  が接するときの  $k$  の値は, 2 式から  $y$  を消去して


$$x^2 - x + 1 = kx \quad \text{すなわち} \quad x^2 - (k+1)x + 1 = 0$$

この方程式の判別式および重解について,  $D = 0$ ,  $x = \frac{k+1}{2}$  であるから

$$(k+1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0, \quad 0 \leq \frac{k+1}{2} \leq 2$$

したがって  $k = 1$

よって, 原点を通る直線  $y = x$  は, 点  $(1, 1)$  で接する. 原点と点  $(2, 3)$  を通る直線  $y = \frac{3}{2}x$  は, 放物線との交点  $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$  をもつから, 求める面積を  $S$  とすると, 右の図から



$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \{(x^2 - x + 1) - x\} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 \left\{ \frac{3}{2}x - (x^2 - x + 1) \right\} dx \\ &= \int_0^1 (x-1)^2 dx - \int_{\frac{1}{2}}^2 \left( x - \frac{1}{2} \right) (x-2) dx = \frac{43}{48} \end{aligned}$$

別解 ( $r = OR$  とする極座標による求積法)

$$r^2 = x^2 + y^2 = x^2(1 + \tan^2 \theta) = \frac{x^2}{\cos^2 \theta}$$


$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{x^2 - x + 1}{x} \quad \text{を } x \text{ で微分して} \quad \frac{1}{\cos^2 \theta} \cdot \frac{d\theta}{dx} = 1 - \frac{1}{x^2}$$

上の 2 式から  $r^2 d\theta = (x^2 - 1) dx$

右の図から, 求める面積  $S$  は

(注意: 積分区間は, 回転角の向きにとる)

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{C_1} r^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{C_2} r^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 (x^2 - 1) dx + \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^0 (x^2 - 1) dx = \frac{43}{48} \end{aligned}$$



- (2)  $K$  は  $xy$  平面に関して対称であるから, 求める体積を  $V$  とすると

$$V = \frac{1}{3} S \cdot OP \times 2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{43}{48} \cdot 1 \times 2 = \frac{43}{72}$$