II 円Oに内接する四角形ABCDにおいて、 $AB = 6$ 、 $BC = 4$ 、 $\angle ABC = 60^\circ$ であり、 $AD : CD = 1 : 2$ である。このとき、次の問いに答えなさい。

(1) $AC = \boxed{10}\sqrt{\boxed{11}}$ であり、円Oの半径は $\frac{\boxed{12}\sqrt{\boxed{13}\boxed{14}}}{\boxed{15}}$ である。

(2) $AD = \boxed{16}$ 、 $CD = \boxed{17}$ である。

(3) 四角形ABCDの面積は $\boxed{18}\sqrt{\boxed{19}}$ である。

また、 $BD = \frac{\boxed{20}\boxed{21}\sqrt{\boxed{22}}}{\boxed{23}}$ であるから、対角線AC、BDのなす

角を θ とすると、 $\sin \theta = \frac{\sqrt{\boxed{24}}}{\boxed{25}}$ である。

III k を実数の定数とする。2つの2次方程式

$$x^2 - (2k - 3)x - k = 0 \quad \dots \textcircled{1} \quad x^2 - (2k + 1)x + 3k = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

について、次の問いに答えなさい。

(1) 方程式①が $x = -2$ を解にもつとき、 $k = \frac{\boxed{26}}{\boxed{27}}$ であり、

①のもう1つの解は $\frac{\boxed{28}}{\boxed{29}}$ である。

(2) 方程式①の2つの解の差が $\sqrt{5}$ であるとき、 $k = \boxed{30}$ である。

(3) 方程式①、②が共通な実数の解をもつとき、 $k = \boxed{31}$ または $k = \boxed{32}$ である。ただし、 $\boxed{31} < \boxed{32}$ とする。また①、②の共通でない方の解の和は、 $k = \boxed{31}$ のとき、 $\boxed{33}\boxed{34}$ 、 $k = \boxed{32}$ のとき $\boxed{35}$ である。

数学 II・数学 B

I 次の の中にもっとも適する答えを下の選択肢の中から選びなさい。

- (1) a, b を実数とする。3 次方程式 $x^3 + ax^2 + 5x + b = 0$ の 1 つの解が $1 - \sqrt{2}i$ であるとき, $a = \text{ 1}$, $b = \text{ 2}$ であり, 他の 2 つの解のうち実数の解は 3 である。

1 の選択肢 ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

2 の選択肢 ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

3 の選択肢 ① -4 ② -3 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

- (2) $x > -1$ のとき, $\frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$ は $x = \text{ 4}$ で最小値 5 をとる。

4 の選択肢 ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

5 の選択肢 ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

- (3) $x > 1$ とする。 $x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} = \sqrt{5}$ のとき, $x + x^{-1} = \text{ 6}$, $x^2 + x^{-2} = \text{ 7}$ であり, $x^2 - x^{-2} = \text{ 8}$ である。

6 の選択肢 ① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ 5 ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ 25

7 の選択肢 ① 3 ② 18 ③ 20 ④ 23 ⑤ 125

8 の選択肢 ① $-8\sqrt{5}$ ② $-5\sqrt{5}$ ③ $5\sqrt{5}$ ④ $8\sqrt{5}$ ⑤ $16\sqrt{5}$

- (4) $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき $y = 6 \sin \theta + 8 \cos \theta$ の最大値は 9 であり, そのときの θ の値について, $\sin \theta = \text{ 10}$, $\cos \theta = \text{ 11}$ である。

9 の選択肢 ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

10 の選択肢 ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

11 の選択肢 ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

II 3点 $A(3, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 2)$ を通る平面を α とし, 原点 O から平面 α に垂線 OH を下ろす。このとき, 次の問いに答えなさい。

(1) $\overrightarrow{OH} = l\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB} + n\overrightarrow{OC}$ とおくと,

$$m = \frac{\boxed{12}}{\boxed{13}}l, n = \frac{\boxed{14}}{\boxed{15}}l \text{ である。}$$

(2) $\overrightarrow{OH} = \left(\frac{\boxed{16}}{\boxed{11}}, \frac{\boxed{17}}{\boxed{11}}, \frac{\boxed{18}}{\boxed{11}} \right)$ である。

(3) $|\overrightarrow{OH}| = \frac{\boxed{19}\sqrt{\boxed{20}\boxed{21}}}{\boxed{22}\boxed{23}}$ であり, $\triangle ABC$ の面積は $\sqrt{\boxed{24}\boxed{25}}$ である。

III 放物線 $C_1: y = x^2 - 2x + 2$, 放物線 $C_2: y = -x^2 + 3x$ と, 傾き 2 の直線 l があり, 直線 l は放物線 C_1 と点 A で接する。このとき, 次の問いに答えなさい。

(1) 直線 l が放物線 C_1 に接するとき, l の方程式は $y = 2x - \boxed{26}$ であり, 点 A の座標は, $(\boxed{27}, \boxed{28})$ である。

(2) 点 A で, 直線 l と直交する直線は $y = \frac{\boxed{29}\boxed{30}}{\boxed{31}}x + \boxed{32}$ であり,

この直線と放物線 C_1 で囲まれた図形の面積は $\frac{\boxed{33}\boxed{34}\boxed{35}}{\boxed{36}\boxed{37}}$ である。

(3) 直線 l と放物線 C_2 で囲まれた図形の面積は $\frac{\boxed{38}}{\boxed{39}}$ であり, 直線 l と放物線 C_2 で囲まれた図形が, 放物線 C_1 によって分けられる 2 つの部分の面積を S_1, S_2 とし, $S_1 > S_2$ とするとき, $S_1 = \boxed{40}S_2$ である。

解答例

数学 I・数学 A

$$\text{I (1) } 6 - 3x < 2x \text{ より } \frac{6}{5} < x \quad \cdots \text{①}$$

$$2x < x + a \text{ より } x < a \quad \cdots \text{②}$$

$$\text{①, ② より } \frac{6}{5} < x < a$$

この不等式を満たす整数 x が 4 個存在するとき, その整数は 2, 3, 4, 5 である. したがって, a のとりうる値の範囲は $5 < a \leq 6$

$$(2) \sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta \text{ であるから } \cos \theta = \sqrt{3}(\sin \theta - 1) \quad \cdots \text{①}$$

$$\sin \theta - 1 \leq 0 \text{ より } \cos \theta \leq 0 \text{ であるから } 90^\circ \leq \theta \leq 180^\circ \quad \cdots \text{②}$$

① を $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ に代入して

$$\sin^2 \theta + 3(\sin \theta - 1)^2 = 1$$

$$\text{整理して } 2\sin^2 \theta - 3\sin \theta + 1 = 0$$

$$\text{因数分解して } (\sin \theta - 1)(2\sin \theta - 1) = 0$$

$$\text{したがって } \sin \theta = 1 \text{ または } \sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\text{② に注意して } \theta = 90^\circ, 150^\circ$$

$$(3) \quad P = \{6 \cdot 2, 6 \cdot 3, 6 \cdot 4, \dots, 6 \cdot 16\} \text{ より } n(P) = 16 - 2 + 1 = 15$$

$$Q = \{10 \cdot 1, 10 \cdot 2, 10 \cdot 3, \dots, 10 \cdot 9\} \text{ より } n(Q) = 9$$

$$P \cap Q = \{30 \cdot 1, 30 \cdot 2, 30 \cdot 3\} \text{ より } n(P \cap Q) = 3$$

$$\text{ゆえに } n(P \cup Q) = n(P) + n(Q) - n(P \cap Q) = 15 + 9 - 3 = 21$$

$$\text{また } n(P \cap \bar{Q}) = n(P) - n(P \cap Q) = 15 - 3 = 12$$

$$(4) \text{ 2 回とも赤玉の確率は } \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

$$\text{1 回だけ赤玉の確率は } \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{25}$$

$$\text{2 回とも白玉の確率は } \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$$

よって, 与えられる得点を X 点とすると, 右のような表ができる.
 X の期待値は

X	10	20	30	計
確率	$\frac{9}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{4}{25}$	1

$$10 \times \frac{9}{25} + 20 \times \frac{12}{25} + 30 \times \frac{4}{25} = 18$$

II (1) $\triangle ABC$ に余弦定理を用いると

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B \\ &= 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cos 60^\circ \\ &= 36 + 16 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \times \frac{1}{2} \\ &= 28 \end{aligned}$$

$$AC > 0 \text{ であるから } AC = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

$$\text{正弦定理により } \frac{2\sqrt{7}}{\sin 60^\circ} = 2R$$

$$\text{したがって } R = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{7}}{\sin 60^\circ} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{7} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$$

(2) $AD : CD = 1 : 2$ であるから, $AD = k$ とおくと $CD = 2k$

四角形 ABCD は円に内接するから $\angle CDA = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ$

$\triangle ACD$ に余弦定理を用いると

$$\begin{aligned} AC^2 &= AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos 120^\circ \\ (2\sqrt{7})^2 &= k^2 + (2k)^2 - 2 \cdot k \cdot 2k \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ 28 &= 7k^2 \\ k^2 &= 4 \end{aligned}$$

$k > 0$ であるから $k = 2$ すなわち $AD = 2, CD = 4$

(3) 四角形 ABCD の面積 S は

$$\begin{aligned} S &= \triangle ABC + \triangle ADC \\ &= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \sin 120^\circ \\ &= 6\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \\ &= 8\sqrt{3} \end{aligned}$$

$\angle DAB = \alpha$ とする. $\triangle ABD$ において,
余弦定理を用いると

$$\begin{aligned} BD^2 &= 2^2 + 6^2 - 2 \cdot 2 \cdot 6 \cos \alpha \\ &= 40 - 24 \cos \alpha \end{aligned}$$

四角形 ABCD は円に内接するから

$$\angle BCD = 180^\circ - \alpha$$

$\triangle BCD$ において, 余弦定理を用いると

$$\begin{aligned} BD^2 &= 4^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cos(180^\circ - \alpha) \\ &= 32 + 32 \cos \alpha \end{aligned}$$

よって $40 - 24 \cos \alpha = 32 + 32 \cos \alpha$ これを解いて $\cos \alpha = \frac{1}{7}$

ゆえに $BD^2 = \frac{256}{7}$ すなわち $BD = \frac{16\sqrt{7}}{7}$

対角線 AC, BD のなす角は θ であるから,
四角形 ABCD の面積 S は

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot BD \sin \theta$$

したがって

$$8\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{7} \times \frac{16\sqrt{7}}{7} \sin \theta$$

よって $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

四角形 ABCD の対角線の交点を E とし, $EA = a$, $EB = b$, $EC = c$, $ED = d$, $\angle BEC = \theta$ とすると

$$\triangle EAB = \frac{1}{2}ab \sin(180^\circ - \theta) = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$

$$\triangle EBC = \frac{1}{2}bc \sin \theta$$

$$\triangle ECD = \frac{1}{2}cd \sin(180^\circ - \theta) = \frac{1}{2}cd \sin \theta$$

$$\triangle EDA = \frac{1}{2}da \sin \theta$$

ゆえに, 四角形 ABCD の面積 S は

$$\begin{aligned} S &= \triangle EAB + \triangle EBC + \triangle ECD + \triangle EDA \\ &= \frac{1}{2}ab \sin \theta + \frac{1}{2}bc \sin \theta + \frac{1}{2}cd \sin \theta + \frac{1}{2}da \sin \theta \\ &= \frac{1}{2}(ab + bc + cd + da) \sin \theta \\ &= \frac{1}{2}(a + c)(b + d) \sin \theta = \frac{1}{2}AC \cdot BD \sin \theta \end{aligned}$$

したがって, 次のことが成り立つ.

四角形の面積

対角線の長さが p, q , そのなす角が θ である四角形の面積 S は

$$S = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$

III (1) $x = -2$ が方程式 ① の解であるから

$$(-2)^2 - (2k - 3) \cdot (-2) - k = 0 \quad \text{これを解くと} \quad k = \frac{2}{3}$$

$$\text{このとき方程式は} \quad x^2 + \frac{5}{3}x - \frac{2}{3} = 0$$

$$\text{したがって, 方程式} \quad 3x^2 + 5x - 2 = 0 \quad \text{を解いて} \quad x = -2, \frac{1}{3}$$

$$\text{ゆえに, もう1つの解は} \quad x = \frac{1}{3}$$

(2) 方程式①の解は

$$x = \frac{-\{-(2k-3)\} \pm \sqrt{\{-(2k-3)\}^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-k)}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{2k-3 \pm \sqrt{4k^2-8k+9}}{2}$$

であるから, 2つの解の差は

$$\frac{2k+1+\sqrt{4k^2-8k+9}}{2} - \frac{2k+1-\sqrt{4k^2-8k+9}}{2}$$

$$= \sqrt{4k^2-8k+9}$$

ゆえに $\sqrt{4k^2-8k+9} = \sqrt{5}$

両辺を平方して $4k^2-8k+9=5$

整理して $k^2-2k+1=0$

これを解いて $k=1$

(3) ①, ②の共通な解を α とすると

①から $\alpha^2 - (2k-3)\alpha - k = 0 \quad \dots \textcircled{3}$

②から $\alpha^2 - (2k+1)\alpha + 3k = 0 \quad \dots \textcircled{4}$

③ - ④から $4\alpha - 4k = 0$ すなわち $\alpha = k$

これを③に代入して $k^2 - (2k-3)k - k = 0$

$$-k^2 + 2k = 0$$

$$k = 0, 2$$

[1] $k=0$ のとき

方程式①は $x^2 + 3x = 0$ これを解いて $x = 0, -3$

方程式②は $x^2 - x = 0$ これを解いて $x = 0, 1$

このとき, 共通でない方の解の和は $(-3) + 1 = -2$

[2] $k=2$ のとき

方程式①は $x^2 - x - 2 = 0$ これを解いて $x = 2, -1$

方程式②は $x^2 - 5x + 6 = 0$ これを解いて $x = 2, 3$

このとき, 共通でない方の解の和は $(-1) + 3 = 2$

解答例

数学 II・数学 B

I (1) $1 - \sqrt{2}i$ がこの方程式の解であるから

$$(1 - \sqrt{2}i)^3 + a(1 - \sqrt{2}i)^2 + 5(1 - \sqrt{2}i) + b = 0$$

$$(-5 - \sqrt{2}i) + a(-1 - 2\sqrt{2}i) + 5(1 - \sqrt{2}i) + b = 0$$

整理して $(-a + b) - 2\sqrt{2}(a + 3)i = 0$

a, b は実数であるから

$$-a + b = 0, a + 3 = 0$$

これを解くと $a = -3, b = -3$

このとき, 方程式は $x^3 - 3x^2 + 5x - 3 = 0$

左辺を因数分解すると $(x - 1)(x^2 - 2x + 3) = 0$

したがって $x = 1, 1 \pm \sqrt{2}i$ ゆえに求める解は 1

(2) 右の割り算から

$$x^2 + 3x + 3 = (x + 1)(x + 2) + 1$$

$$\begin{array}{r} x + 2 \\ x + 1 \overline{) x^2 + 3x + 3} \\ \underline{x^2 + x} \\ 2x + 3 \\ \underline{2x + 2} \\ 1 \end{array}$$

であるから

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1} &= \frac{(x + 1)(x + 2) + 1}{x + 1} \\ &= x + 2 + \frac{1}{x + 1} \end{aligned}$$

$x + 1 > 0$ であるから, 相加平均と相乗平均の大小関係により

$$\begin{aligned} x + 2 + \frac{1}{x + 1} &= (x + 1) + \frac{1}{x + 1} + 1 \\ &\geq 2\sqrt{(x + 1) \times \frac{1}{x + 1}} + 1 = 3 \end{aligned}$$

よって $x + 2 + \frac{1}{x + 1} \geq 3$

等号が成り立つのは $x + 1 = \frac{1}{x + 1}$

すなわち $x = 0$ のときである.

したがって $\frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$ は $x = 0$ のとき, 最小値 3 をとる.

- (3) $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ であるから ,
 これに $a = x^{\frac{1}{3}}$, $b = x^{-\frac{1}{3}}$ を代入すると

$$\begin{aligned} x + x^{-1} &= (x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}})^3 - 3(x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}}) \\ &= (\sqrt{5})^3 - 3 \times \sqrt{5} \\ &= 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ であるから ,
 これに $a = x$, $b = x^{-1}$ を代入すると

$$\begin{aligned} x^2 + x^{-2} &= (x + x^{-1})^2 - 2 \\ &= (2\sqrt{5})^2 - 2 = 18 \end{aligned}$$

- $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$ であるから ,
 これに $a = x^2$, $b = x^{-2}$ を代入すると

$$\begin{aligned} (x^2 - x^{-2})^2 &= (x^2 + x^{-2})^2 - 4 \\ &= 18^2 - 4 = 320 \end{aligned}$$

- $x > 1$ より $x^2 - x^{-2} > 0$ であるから

$$x^2 - x^{-2} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$$

- (4) 右の図のように , α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) を

$$\cos \alpha = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \quad \sin \alpha = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

とすると

$$6 \sin \theta + 8 \cos \theta = 10 \sin(\theta + \alpha)$$

であるから

$$y = 10 \sin(\theta + \alpha) \quad (0 < \theta < \pi)$$

は , $\theta + \alpha = \frac{\pi}{2}$ すなわち $\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ のとき最大値 10 をとる .

$$\text{このとき} \quad \sin \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha = \frac{3}{5}$$

$$\cos \theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha = \frac{4}{5}$$

II (1) $\vec{OA} = (3, 0, 0)$, $\vec{OB} = (0, 2, 0)$, $\vec{OC} = (0, 0, 2)$ であるから

$$\begin{aligned}\vec{OH} &= l\vec{OA} + m\vec{OB} + n\vec{OC} \\ &= l(3, 0, 0) + m(0, 2, 0) + n(0, 0, 2) \\ &= (3l, 2m, 2n)\end{aligned}$$

であり, $\vec{OH}$ は, α 上のベクトル

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= \vec{OB} - \vec{OA} = (0, 2, 0) - (3, 0, 0) = (-3, 2, 0) \\ \vec{AC} &= \vec{OC} - \vec{OA} = (0, 0, 2) - (3, 0, 0) = (-3, 0, 2)\end{aligned}$$

に垂直であるから

$$\begin{aligned}\vec{AB} \cdot \vec{OH} \text{ より } -3 \cdot 3l + 2 \cdot 2m + 0 \cdot 2n &= 0 \quad \text{すなわち } m = \frac{9}{4}l \\ \vec{AC} \cdot \vec{OH} \text{ より } -3 \cdot 3l + 0 \cdot 2m + 2 \cdot 2n &= 0 \quad \text{すなわち } n = \frac{9}{4}l\end{aligned}$$

(2) H は α 上の点であるから, $l + m + n = 1$

$$\text{これに (1) の結果を代入すると } l + \frac{9}{4}l + \frac{9}{4}l = 1 \quad \text{ゆえに } l = \frac{2}{11}$$

$$\text{さらに } m = \frac{9}{4} \times \frac{2}{11} = \frac{9}{22}, \quad n = \frac{9}{4} \times \frac{2}{11} = \frac{9}{22}$$

$$\text{したがって } \vec{OH} = \left(3 \times \frac{2}{11}, 2 \times \frac{9}{22}, 2 \times \frac{9}{22} \right) = \left(\frac{6}{11}, \frac{9}{11}, \frac{9}{11} \right)$$

$$(3) \vec{OH} = \frac{3}{11}(2, 3, 3) \text{ であるから } |\vec{OH}| = \frac{3}{11}\sqrt{2^2 + 3^2 + 3^2} = \frac{3\sqrt{22}}{11}$$

$$|\vec{AB}|^2 = (-3)^2 + 2^2 + 0^2 = 13$$

$$|\vec{AC}|^2 = (-3)^2 + 0^2 + 2^2 = 13$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -3 \cdot (-3) + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 9$$

であるから, $\triangle ABC$ の面積 S は

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{AB}|^2|\vec{AC}|^2 - (\vec{AB} \cdot \vec{AC})^2} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{13 \cdot 13 - 9^2} = \sqrt{22}\end{aligned}$$

III (1) $f(x) = x^2 - 2x + 2$ とおくと

$$f'(x) = 2x - 2$$

接点の x 座標を a とすると

$f'(a) = 2$ であるから

$$2a - 2 = 2 \quad \text{ゆえに} \quad a = 2$$

また $f(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 + 2 = 2$

したがって、接点の A の座標は $(2, 2)$

よって、直線 ℓ は点 $A(2, 2)$ を通り、傾き 2 の直線であるから

$$y - 2 = 2(x - 2) \quad \text{すなわち} \quad y = 2x - 2$$

(2) 直線 ℓ に垂直な直線の傾きを m とすると

$$2m = -1 \quad \text{から} \quad m = -\frac{1}{2}$$

よって、点 A で ℓ と直交する直線の方程式は

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 2)$$

すなわち $y = -\frac{1}{2}x + 3$

C_1 とこの直線の共有点の x 座標は

$$x^2 - 2x + 2 = -\frac{1}{2}x + 3 \quad \text{これを解いて} \quad x = -\frac{1}{2}, 2$$

求める図形の面積 S は、図から

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\frac{1}{2}}^2 \left\{ \left(-\frac{1}{2}x + 3 \right) - (x^2 - 2x + 2) \right\} dx \\ &= - \int_{-\frac{1}{2}}^2 \left(x + \frac{1}{2} \right) (x - 2) dx \\ &= - \left(-\frac{1}{6} \right) \left\{ 2 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right\}^3 = \frac{125}{48} \end{aligned}$$

(3) 直線 l と放物線 C_2 の共有点の x 座標は

$$2x - 2 = -x^2 + 3x \quad \text{これを解いて} \quad x = -1, 2$$

求める図形の面積 $S_1 + S_2$ は、図から

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 &= \int_{-1}^2 \{(-x^2 + 3x) - (2x - 2)\} dx \\ &= - \int_{-1}^2 (x + 1)(x - 2) dx \\ &= - \left(-\frac{1}{6}\right) \{2 - (-1)\}^3 = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

放物線 C_1 と放物線 C_2 の共有点の x 座標は

$$x^2 - 2x + 2 = -x^2 + 3x \quad \text{これを解いて} \quad x = \frac{1}{2}, 2$$

C_1 と C_2 で囲まれた図形の面積は

$$\begin{aligned} &\int_{\frac{1}{2}}^2 \{(-x^2 + 3x) - (x^2 - 2x + 2)\} dx \\ &= -2 \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(x - \frac{1}{2}\right) (x - 2) dx \\ &= -2 \times \left(-\frac{1}{6}\right) \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

したがって

$$S_1 + S_2 = \frac{9}{2}, \quad S_2 = \frac{9}{8}$$

よって $S_1 = \frac{27}{8}$

ゆえに $S_1 = 3S_2$

	解 答 欄											解 答 欄											
1	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	21	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	22	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
3	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	23	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
4	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	24	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
5	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	25	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
6	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	26	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
7	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	27	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
8	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	28	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
9	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	29	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
10	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	30	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
11	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	31	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
12	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	32	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
13	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	33	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
14	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	34	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
15	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	35	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
16	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	36	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
17	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	37	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
18	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	38	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
19	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	39	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
20	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	40	⊖	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩